

，潛伏在土中的本病菌即告死亡。

腫柄病的防治原則

1. **注重初期預防及病菇拔除**：在腫柄病的防治上，初期的預防及病菇的拔除為主要的工作。由於厚膜孢子在覆土中數量的多寡，決定了此病發生的嚴重性，若能減少土壤中厚膜孢子的數目，當可減少病害的發生。

2. **覆土必須消毒**：厚膜孢子普遍存在於土壤中，因此覆土的消毒工作乃為必需，而以蒸氣消毒為最可行，因厚膜孢子對蒸氣較敏感。

3. **避免與泥土地接觸以防再感染**：進行覆土消毒時，應在水泥地上施行，並且以塑膠布覆蓋，避免和泥土地接觸，以防再感染。

4. **減少可能的感染源**：另外應減少其他可能的感染源，如上期的舊堆肥，或夾在竹縫中的覆土及堆肥，栽培室內的器具等，都可為感染源。


因此對於室內的清潔為首要，尤其應注意廢棄的堆肥屑及覆土，儘量清除乾淨，並配合菇舍的消毒。

前項覆土的消毒及菇舍的清潔，若處理得宜，當可減少病害的發生。

5. **農藥交替使用，以免發生抗藥性**：若仍然發生

病害，而在未有更良好的藥劑以前，則以霉敵或巴斯丁噴酒（依農林廳植物保護手冊使用）。但應注意長期使用可能產生抗藥性，因此，農藥應交替使用，但不應同時混合使用。

6. **病菇應連菇腳徹底拔除**：在發現腫柄病的異常體時，應迅速將它整個拔起，且不留菇腳，並檢視是否完全。否則，未清除的病菇，很快就可產生腫柄病菌的厚膜孢子，而造成第2次的感染。



——聚生型腫柄病——

農林廳許可證肥字第0165號
經濟部檢驗局(內檢字)第502033號

微量要素、
綜合液體肥料
(人畜無害)



葉面撒布
苗床灌注

效果：
※ 促進萌芽、培養發育
※ 提高品質、增收產量
※ 促進生長、防止落花落果

不一樣就是不一樣

富多農
植物細胞賦活劑
農作物培養基營養素



適用作物：
※ 蔬菜、果樹、水稻、
豆麥、菸草、蘆筍、
葡萄、茶葉、花草、
育苗、雜作等等作物



誠徵各縣市鄉鎮經銷商

功用企業有限公司

總公司：台北市八德路三段158巷20弄17號二樓 TEL: (02) 7413381
工廠：台中縣大肚鄉燕廬村太平路3號 TEL: (046) 911056