

幾500台斤，如果堤防有明溝要修補。池塘經過曝曬後注水，準備放養魚苗。

(二)放養魚苗

放養魚苗要根据養成計畫，按魚苗大小、放養時間、放養密度等配合實施，俾能充分利用魚池的生產力。鯪魚要放養4台寸以上的，才能在年底捕售。魚苗要選體型大小略同，屬於同批魚苗，發育正常整齊，體色鮮明光滑，游泳迅速活潑無病態者。

放養時期最好是在2月間完成，因這時期水溫較低，魚的活動力弱，在撈捕與放養的過程中，魚體不易受傷，能減少死亡率。在冬季或初春放養魚苗時，要選天晴比較溫暖之日進行。夏天則要在上午9~10時放養，不可在烈日當空時搬運，增加死亡率。

鯪、鰱具有終身攝食浮游生物的特性，鰱魚喜吃動物性浮游生物，而動物性浮游生物攝食植物性浮游生物。鰱魚攝食大量植物性浮游生物，對人工投飼的餌料，攝食能力比鰱魚強，所以鰱鰱混養時，鰱的放養量應少於鰱，才能保持正常的成長。

放養密度要適當，如果放養過密，水中溶氧量會過低，影响到池魚的成長。水源豐富的池塘，能多放，在夏天水溫升高，水中溶氧量降低，池魚浮頭時，可迅速注水急救。水源條件較差的池塘則要少放，以免池魚浮頭時無法注水，遭受無謂的損失。

單養時，每坪放養2~3尾，一般計算放養量是根据魚池的生產力來決定，例如一坪能生產2台斤時，要收成2台斤者，可放1尾。欲得1台斤者，可放2尾，再加上約二成的數量而放養。

搬運魚苗要先經過密集蓄養，使其排除糞便，以防搬運的水受污染，搬運器具、近距離數量少時，可用鋤柄或魚苗籠。較遠者用大木桶以卡車搬運，近年多用塑膠袋灌入氧氣運輸。魚苗運到池塘後，要立即

放養，放養時，將容器放入池水中，使水慢慢流入容器內，藉以調節水溫，然後任由魚苗游出。

(三)給餌

1.給餌方法：餌料的質量與投餌技術，為增加產量的重要關鍵。必須根據成長情形、池魚活動情況、季節、天氣、水質、水溫等因素，來決定餌料的質、量及適當的投餌地點與時間，才能得到最好的效果。

人工餌料有植物質和動物質兩種。動物質餌料的餌料效率較植物質的為佳，但其成本較高，且各種魚的食性又不盡相同，所以應依其嗜食情形，加以適當的調配最為重要，如此不但能降低成本，還能促進食欲，給餌方法依餌料的種類、形狀，決定撒餌或置餌。

鯪、鰱餌料，在幼魚時期食性不同，但長成後所攝食的人工餌料相差不多，其中屬於動物性者，有蠶蛹與魚粉。屬於植物性者，有米糠、麥麩、豆粕等，都可飼餵。

2.撒餌：將粉末或粒狀飼料，撒布於魚池的一處或數處的投餌場，習慣上池魚會聚集在投餌場，對於粉末餌料，因為容易浮於水面而逸散，可加些水，或設投餌瓶將餌料投入池中。

3.置餌：將餌料加水拌成練餌，投與在投餌場懸掛的投餌籠。其投餌深度依魚種加以調整，鰱、鰱應掛在水面下0.3~0.5公尺深處。在春秋宜淺些，夏季要深些較易攝餌。投餌場宜設於朝南日照良好，人的來往較少的地方。

給餌次數：飼養鰱鰱時，其給餌次數因季節、水溫的不同而有差別。春秋兩季，水溫不高不低，鰱鰱攝餌旺盛可多給。在炎熱的夏季與寒冷的冬天要少投，每日約投2~3次。

4.給餌量：魚的攝餌量，因天氣的好壞，水溫的高低、水質優劣，魚的體型等各種因素而變。所以每日投餌量，須觀察這些因素與魚的攝餌狀態來決定，

全國唯一豆類栽培參考書

台大園藝系黃滴教授及農發會譚靜吾技正共同策劃

豐年叢書 #794

豆類蔬菜

8位專家分別撰著

內容：花生、毛豆、紅豆、綠豆、菜豆、菜豆、豌豆、蠶豆、豇豆、鵲豆、刀豆、回回豆、金麥豌豆、米豆、紅(白)花菜豆、小豆、翼豆、角豆、巴巴拉花生、樹豆、穗豆等24種
附營養成分表、綠豆芽生產及重要品種檢索表等，插圖豐富，全書152頁。

定價：平裝120元・精裝150元
(郵購另加掛號郵資9元)

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930