如果攝餌欠佳，要檢討它的原因。投餌後1～2小時攝餌終了時，檢查是否還留有殘餌，以調整投餌量，一般投餌量約為池魚體重的3～5％。以決定每日實際投餌量的各種條件：

1.魚類攝食情形，倘若投餌後很快就吃光，應適當增加投餌量，如投餌後長時間吃不完，甚至剩餘到晚間，要減少投餌量。在高密度放養的池塘中，如魚沒有疾病，水質良好，氧氣充足，一般投餌後很快的吃光，不會有殘餌。

2.天氣變化，如天氣晴朗應多投，悶熱且將下雨時應少投，以免引起浮頭。天氣酷熱時於早晨與傍晚投餌，投餌量要適當減少。

3.魚類活動狀況，如魚體健壯，活潑游動時多投，發病時要少投或停投，浮頭或即將浮頭時不投。

4.水質情況，如水質瘠時多投，過肥時少投。

六・池塘管理

養魚池的池水對魚類的影响最大，應設法保持良好的水質。池水受了殘餌、魚的排泄物等影响，使水質發生變化，致使夏季高水溫的下半夜至凌晨，或無風悶熱的晚上發生缺氧，使池魚斃死，所以每日清晨要巡視魚池加以預防。

如果投餌後魚體沒有不同，而攝餌欠佳時，或池魚浮於水面而散亂未成羣，是會發生浮頭的現象。浮頭輕者日出後就會恢復正常，嚴重者會延長4～5小時之久。此時要儘量注水，如有曝氣筒或水車等設備，要開動以增加溶氧。

開始發生浮頭的魚，如還能成羣迴游，被聲音驚動會立即潛入水中，則沒有問題。鰱鱅不但易發生浮頭，對浮頭的抵抗力也弱，悶熱的夏天要特別注意。

捕獲時先用網圍捕，剩下的少部分漏網之魚，再排乾池水全部撈捕。如果池塘大，產量多時，應排水至水深3～4台尺，用網圍捕，連續圍捕2～3日後，才排乾捕清。

飼養鰱鱅的魚池，無論池大小，放養數量多寡，養到一定體型，或者一定期限，最好全部撈捕，如此可以乾池，整理魚池準備次年再飼養。

出售食用魚，要視消費情形，如果消費量大，可大量撈捕。不然捕獲量多而消費量少，會影响銷路，也會影响售價。捕獲後在清水流通的蓄養池蓄養，此時鰱容易狂奔亂撞，使頭部受傷，要小心採捕並及早出售。

您想知道——
東台縱谷的開發前途嗎？

豐年叢書HV＃801
本書介紹台灣千變萬化的地形景觀、水土保育的地理景觀及環境衝擊的城鄉景觀，圖版多，內容豐富。
定價100元（郵購另加掛號郵資9元）
豐年社 台北市温州街14號 郵政劃撥5930號

便利東部地區讀者訂購
農學社是東部唯一農業圖書專門店