

## 香菇太空包

### 感染青黴素

● 本公司購買香菇太空包 20,000包，在海拔700公尺的寶來山區進行試種。請問：

(1)香菇太空包長青黴菌，不知如何處理？

(2)有些香菇長出菇柄就枯萎？有些剛冒出還未形成柄就萎縮不生長，不知是何原因？

(3)香菇太空包，形成黑褐色的被膜，是接種後大約多少日子才有此現象？此時是否還能夠長出香菇？

(4)本省香菇太空包之經營，何處最為成功？(台南市衛國街 177號王德生)


● (1)香菇太空包，若在菌絲未長滿時感染青黴菌，應棄置。否則孢子散出會感染其他健全太空包。

如在開包後再感染，可將感染部份割去，並噴洒「霉敵」3,000倍液。

(2)香菇長出後枯萎可能原因有，①受病菌侵害，

②突遇高溫，③菌絲未達成熟即行開包。

(3)形成黑色被膜的時間，依品種而定，大約在2~4個月可形成，開包後更易形成，由此長出香菇為



正常現象。

(4)本省香菇太空包管理目前以台中縣中興嶺及南投縣魚池鄉較為成功，可與台中縣大里鄉「省菌種協會」聯繫參觀。(廖英明)

## 花跳·石跳仔

● (1)花跳產於何處？繁殖期為何？

● (2)魚苗可否人工繁殖？

(3)花跳與石跳仔如何區別？(台中縣大肚鄉遊園路2段184巷6號吳麗梅)

● (1)花跳盛產於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等各縣的沿海。繁殖季節為4~9月，天然苗的採捕，6~8月最多。

(2)花跳的人工繁殖，目前還沒有成功。魚苗在台南縣北門一帶生產較多，因養殖的人多，供不應求，也有從國外進口的魚苗，但養殖成績較差。

(3)花跳(又名星點彈塗)體色青藍，有淡色小點星散布全身，第1背鰭只有5棘條，體型比石跳仔大，成熟者全長12~15公分，體重30~40公克。

石跳仔，台語又稱恐鱗仔(跳彈塗)，魚體上部為青藍色，下方為白色，第1背鰭有15~16棘條，體型小，肉略帶苦味，無經濟價值。(陳勝香)



## 鵝飼料

● (1)養鵝若無青草做佐料，全賴飼料生長，應如何供食，才不致浪費或不足？

(2)用生魚絞成肉醬餵食，要不要先煮熟？魚刺對鵝有無影響？(台中縣烏日鄉湖口村三民街新盛巷17號陳坤煌)

● (1)鵝是草食禽類，應以供給青料較佳。如只以完全飼料投與，飼料成本較高，所以在飼料原料的選擇方面，可儘量採用價格較低的原料配合，如米糠、麥片、玉米粉、甘薯等均可利用，並酌增成比率。觀察攝食情形，再斟酌加減給飼量。

(2)魚肉醬的飼養仍以新鮮、蒸熟為佳，以防細菌的污染。魚刺可能刺傷鵝的消化道，宜慎防之。(彰化種畜繁殖場)