

20世紀80年代最新系統性低毒綜合殺蟲劑  
防治葉面與地下害蟲，線蟲，控制毒素病  
粉劑、粒劑、乳劑、可濕性粉劑

FMC<sup>®</sup> 出品

# 新好年丹<sup>®</sup>

## Marshal<sup>®</sup>

美國 FMC 公司繼  
「好年冬」農藥後  
最新發明之專利藥劑  
中華民國發明專利 15 年

經濟部中央標準局專利證書號碼第 11356 號

R 係註冊商標證號碼第 132819 號與第 150722 號

### 新好年丹類綜合性殺蟲劑政府推廣之使用方法及適用範圍

藥劑別	使用範圍		使用方法(每公頃每次用藥量)及注意事項	
1% 粉劑	落花生	根瘤蚜蟲	200 公斤 / 公頃	1. 播種同時植溝處理 2. 種前當日開溝 15 公分條施之即可播種。
	水稻	褐飛虱	50 公斤 / 公頃(次)	採收前 10 天停止用藥。
2% 粉劑	水稻	負泥蟲	40 公斤 / 公頃	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後田間密度尚高，隔 15 天再施藥一次。 2. 分蘗盛期以前使用。
		褐飛虱	40 公斤 / 公頃(次)	採收前 20 天停止用藥。
3% 粒劑	水稻	育菌箱菌毒	120 公克 / 每育菌箱	於播種時均勻拌土施用 20 公克，機械插秧前 24 小時再施用 100 公克，並兼水至飽和狀態。
30% 可濕性粉劑	水稻	褐飛虱	1.5 公斤 / 公頃(次) (800 倍)	採收前 20 天停止用藥。
40% 可濕性粉劑	柑桔	蚜蟲	2 公斤 / 公頃(次) (1200 倍)	1. 於春、夏芽萌發之前，若發生蚜蟲類，每 10 天施藥一次，共施藥二次。 2. 採收前 20 天停止用藥。
	水稻	負泥蟲	0.8~1.2 公斤 / 公頃 (1200 倍) (次)	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔 15 天再施藥一次。 2. 分蘗盛期以前使用。
48.34% 乳劑	水稻	褐飛虱	1.2 公升 / 公頃(次) (100 倍)	
	西瓜	刺馬	0.6~1.2 公升 / 公頃 1000~1500 倍	於刺馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續四次。
	柑桔	刺馬	1~2 公升 / 公頃 1000 倍	開花授粉後，於落花三分之一時及落花後兩星期內各施藥一次。
	蘋果	刺馬	1.5~2 公升 / 公頃 1000 倍	開花結果後每隔 10 天噴藥一次，連續五次以上。



正豐

化學股份有限公司  
台中縣霧峰鄉民生路 200 號  
電話：(043) 393201~3



® 台灣總代理：國際技術社股份有限公司  
國外製造廠：FMC Corporation  
Agricultural Chemical Division