

水仙

栽培管理

• • 林芸萍 • •


水仙是農曆春節前後最暢銷的球根花卉，如何繁殖水仙球莖，須有專業栽培技術，以下謹提供參考。

栽培方法

水仙性喜低溫，約 10°~18℃ 較適宜球根肥大，本省北部與中部山區均有栽培繁殖，每分地（約 300 坪）可種植 1 萬球左右。

每年約 9 月下旬至 10 月上旬，將子球定植在排水良好的壤土，種植前需先置放基肥。水仙球莖本身亦先經過消毒，可用 80% 鋅錳乃浦（大生 M-45）加水 600~800 倍，或免賴得可濕性粉劑加水 1,000 倍浸泡 2 小時後種植。

種植時芽尖向上，株距為本球體積的 2 倍。生長期間須加追肥 2~3 次，氮肥勿施過多，以防徒長。為防治病蟲害發生，可用上述兩種農藥（殺菌劑），配合殺蟲劑輪流或合併使用，並視水仙生長的健康狀況，決定增加噴佈的次數。



—— 盛開的水仙 ——



若在生長期中發現病株，如毒素病或立枯病等，需立即將病株連根掘出，焚燒全株，免其傳染，尤其是毒素病，目前尚無有效的藥物能治它。

至翌年 5、6 月待其葉枯萎（開始休眠）後即可挖起。又種植水仙必須採用輪作比較好，病蟲害會減少些。

收穫與貯藏

水仙球莖貯藏前亦須消毒，並洗淨表面的泥土，然後陰乾，置於乾燥通風處，待表皮十分乾燥後才可收藏。

收藏的容器亦須通風良好（可用硬質塑膠筐，很理想，並可重疊放置，整齊且不占太多空間），然後選擇大球分級貯放，小球做為繁殖用，大球將來要出售。

基本上，收穫量是種植量的 3 倍，也就是說，種植 1 公斤的水仙小球，必須有 3 公斤的收穫量才對。

徵 各縣市 土壤薰蒸 服務社代表

1. 要突破農作物的收成，就要採用最新的土壤薰蒸藥劑。
 2. 高農畢業在鄉從事農作，對土壤薰蒸推廣有遠見，具有實務經驗者尤佳。
 3. 應徵人員將履歷、相片、自薦書寄
- 台北市延平南路 230 巷 4 號
柯主任收，合者約談面洽。