

矮牽牛 繁殖新技術

李時



移植至4吋花盆後開花情形

(續上期)

移苗

移苗的培養土與播種培養土相同最為簡便，若為節省費用，可將水苔泥炭土以杉木屑取代，即以蛭石：杉屑：河砂：真珠砂，依體積比為3：3：2：1，然後拌入已體積已消化的下水道污泥，效果良好。若全用一般田間土壤則生育不良。

現在台灣已有的育苗聯盆，每盤外徑28公分×28公分，內分成25個小盆（5×5個）每小盆口徑為5×5公分。將混合好的培養土裝入聯盆約8分滿，以藥匙或竹片挖取幼苗，手取苗葉，不可手取胚軸，免被手壓傷胚軸引起腐爛而死。

盆土挖一孔，將苗放入。以食母二指輕壓，深度約1~1.5公分

，種後立刻澆水，最好採噴灑灌溉，水滴愈細愈好，以不沖動小苗為原則。一箱1,000株花苗，可移40盤（每盤25株）育苗聯盆。寒暑假，利用手纖巧的國中女生移苗，成活率很高。平時則需全家總動員參與。

培育花苗，只要科學腦筋，細心謹慎，不花體力，由老到少都可

台肥公司43號花果複合肥料

花卉果樹均可施用



台肥公司已另開關高級花肥1號、2號以及新產品43號花果複合肥料(15-15-15-4)供花卉、果樹等經濟價值高的作物施用。分別為25公斤、10公斤小型包裝，包裝精美，肥效可靠。

台肥公司推廣處所屬新營、員林、豐原服務所於71年3月1日開始正式供銷。3個服務所地址及電話如下，請農友們多多連繫。



1. 新營服務所：台南縣新營鎮開元路59巷64號(066)322320
 2. 員林服務所：彰化縣員林鎮中山路363號(048)321761
 3. 豐原服務所：台中縣豐原市信義街177號(045)226864
- 台肥公司業務處：台北市延平南路101號(02)3719161

操作，是一理想家庭園藝。美國由於花壇植物快速發展，已設計出自動移苗機，以取代人工移苗。台灣尚未開始，先不考慮機械化，但欲從事此育苗產業者，應以移苗所需人工的調配及可售量，供播種量及時間的參考，否則缺乏人工，延誤移苗適期，致成老苗，對以後的生育及品質影響甚巨。

植苗生育環境 及控制方法

移植的苗，所佔面積甚大，無法放在幼苗培育室。在歐美國家，時值早春，大都置於設備簡單的塑膠布溫室內，加溫調節夜溫在10~16度C之間。矮牽牛在台灣最早播種期可在8月上中旬於幼苗培育室內，以冷氣機調節溫度於23~25°C

生長，9月初移苗置於室外，此時氣溫太高又多陣雨，若無適當環境保護，勢必全部腐爛。所以於10月出售的矮牽牛花最需育苗栽培技術，此時有苗可賣者，即販賣栽培技術也。

移出的苗，置於離地的栽培架上，以免雨水把泥土濺上花苗傳染病害。距栽培架約1~1.5公尺高處，遮透明PVC塑膠布防雨，其上再覆以黑色尼龍網，剛移出數天應遮50~80%（視光強而異），以後約遮陰50%即可，以降低溫度，並以噴灑灌溉，防小苗萎凋。待苗長至幅寬5~7公分時，噴施矮化劑B。（每公升水含2.5克，或用Alax 3克），可抑制莖的抽長，並促進側芽的發生。

上述的遮陰，視天候而異，若遇陰雨天，須將遮光網除去，因光線愈多，苗發育愈快，所以所有設

施以機動式較固定設施為佳。9~10月移植苗於平地成活率約在7成以上，品質只屬尚可。要得好品質的花苗，就得利用8~10月間夜溫在10~16度C的冷涼山地育苗。種植蘋果不賺錢的果農，不妨試試此一新產業。

待10月中旬，平地氣溫漸涼之後，運到平地販賣將開花的成苗或將它移到4吋花盆（口徑12公分）時出售，市民於10月中旬買回成苗種植於庭院、陽台窗沿的花槽、花箱及吊籃，或以4吋盆花苗種植於公園、路旁花園。

若不受環境污染為害，予適當澆水施肥管理，矮牽牛就可於11月中旬盛花至翌年6月。盛夏將花箱、盆花及吊籃置於半陰的屋簷下，不受雨淋，則可渡夏使它周年開花，這是其他花卉很少有的特性。

（完）



Robin

樂敏牌

ロビンエンジン

農業、産業
機械之動力源

● 強力 ● 輕便
● 省油 ● 耐用

新發售
最大5.0馬力
EY20D (直結形)



汽油、柴油
二衝程・四衝程
一馬力至二十馬力
各馬力齊全

兼售ROBIN
汽油及柴油發電機
汽油: LG071 LG101 LG151
LG201D LG301D
RG121C RG201D
RG301D RG401D
柴油: RGK161 RGK301D

製造元：
富工重工業株式会社

經銷處：
樂敏有限公司

台北市峨嵋街68號2樓
TEL. 3613541~3