

## 枇杷落果

- (1) 枇杷為何在10~12月會大量落葉？
- (2) 油粕較雞糞在使用上有何優點？
- (3) 枇杷如遇雨量充足，往往不會開花。反在乾旱缺水時大量開花，原因何在？
- (4) 枇杷果實為何在3、4月間南風吹襲時，便會乾枯脫落？如何預防？（台中縣新社鄉永源村中和街42號徐俊明）


● (1) 枇杷在6~8月雨季，易感染葉部病害如角斑病、灰斑病、污葉病及銹病，在秋冬遇低溫及乾燥時，便會大量落葉。

● (2) 油粕類肥料所含養分穩定，較清潔輕便，但比雞糞貴些。

● (3) 枇杷如遇雨水量多，日照不足時，枝葉易徒長，體內碳水化合物含量低下，花芽形成少。反之，乾旱缺水時，可以抑制枝葉徒長，養分蓄積，易形成花芽。

● (4) 南風是一種高溫而乾燥的風，由本省南方吹來，對於在早春密植枇杷園，往往造成氣溫高而地溫低狀況，使枝葉蒸散量大於根部吸水量，果實內水分被葉片所奪取，造成果實乾枯，日燒果及落果現象。

預防方法為，避免密植，施用有機質肥料，維持土壤含水量等措施。（范念慈）



## 盆栽杜鵑的管理

- (1) 盆栽杜鵑葉片背面有小黑點，是何病害？
- (2) 目前花已大部分謝落，長出新葉。請問是否需換土及剪枝？又施肥要領為何？去年我曾施用花寶2、3號，今年花盛開，極為艷麗。（台北縣淡水鎮自強路307巷4號陳壯飛）

● (1) 是斑點病為害所致，應注意盆置處所的通風及日照等。杜鵑發芽之前，每隔1週噴洒「大生45」500~600倍稀釋液，可收預防之效。葉片發病時，每週應噴洒「萬力」2,000~3,000倍稀釋液，連續2~3次。

● (2) 盆栽杜鵑換土、剪定及施肥要點：

① 應於開花後進行換盆，換盆時一定要換新培養土。所用土壤，以含有腐植質而輕鬆的沙質壤土為最理想。

② 換盆時要注意根的處理，先用竹筷梳理根羣，剪除徒長根、冗根、老舊根，整理為適宜根羣，再重新栽植。



在夏季需行摘心2~3次，但如長出徒長枝時，需由基部剪除，不可由中間部切斷，否則，秋末生出新芽，次年絕不着生花蕾。花蕾着生過多時，可將不顯眼裡枝的花蕾，連枝條剪除，這在盆栽杜鵑的剪定技術上，非常重要。

③ 以往施肥是以施用豆粕類的肥料為主，因而有點不夠。你施用些花寶也是可以的，施粉末狀肥料時，應如畫圓圈狀散布於根源與花盆中間，等灌水時可溶於盆土，經腐熟後，被鬚根所吸收。同時亦可施用些加水稀釋的腐熟油渣、魚渣等，1週內可施用1~2次，會有良好的生育與開花。

在換盆後1~2週內，最好不要施肥。較大植株的盆栽，肥料施用過多會發生根腐。

盆栽杜鵑栽植時，最好能摻用些腐葉土，腐葉土含有能直接作為植物營養的良好肥分，能防止土壤的鞏固，並可作為肥料。（楊紹溥）