

20世紀80年代最新系統性低毒綜合殺蟲劑
防治葉面與地下害蟲，線蟲，控制毒素病
粉劑、粒劑、乳劑、可濕性粉劑

FMC[®] 出品

新好年丹[®]

Marshal[®]

美國 FMC 公司繼
「好年冬」農藥後
最新發明之專利藥劑
中華民國發明專利15年

經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

® 係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

新好年丹類綜合性殺蟲劑政府推廣之使用方法及適用範圍

藥劑別	使用範圍	使用方法(每公頃每次用藥量)及注意事項	
1%粉劑	落花生 根瘤線蟲	200公升/公頃	1. 播種同時播種處理 2. 播種前開溝15公分條施之即可播種
	水稻 螟 飛 蛾	50公升/公頃(次)	採收前10天停止用藥
2%粉劑	水稻 負 泥 蟲	40公升/公頃	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後田間密度尚高，隔15天再施藥一次。 2. 分蘗盛期以前使用
	椰子 椰 飛 蛾	40公升/公頃(次)	採收前20天停止用藥
3%粒劑	水稻 青 苗 病	120公升/每青苗箱	於播種時均勻拌土施用20公克，機械播種前24小時再施用100公克，並灌水平飽和狀態
30%可濕性粉劑	水稻 螟 飛 蛾	1.5公升/公頃(次) (800倍)	採收前20天停止用藥
40%可濕性粉劑	柑桔 四 蟲	2公升/公頃(次) (1200倍)	1. 於春、夏兩季發之前，若發生四蟲類，每10天施藥一次，共施藥二次 2. 採收前20天停止用藥
	水稻 負 泥 蟲	0.8~1.2公升/公頃 (1200倍) (次)	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔15天再施藥一次 2. 分蘗盛期以前使用
48.34%乳劑	水稻 螟 飛 蛾	1.2公升/公頃(次) (100倍)	
	西瓜 黃 瓜 蛾	0.6~1.2公升/公頃 1000~1500倍	於開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續四次。
	柑桔 刺 蛾	1~2公升/公頃 1000倍	開花授粉後，於落花前及落花後兩星期內各施藥一次。
	蘋果 刺 蛾	1.5~2公升/公頃 1000倍	開花結果後每週10天噴藥一次，連續五次以上



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(043) 393201~3

FMC

台灣總代理：國際技術社股份有限公司

國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division