

李樹的主要病害有：

(一)黑斑病(斑點病，細菌性穿孔病)：為害葉片、枝條、果實。葉片罹病初期發生水浸狀的斑點，逐漸地形成赤褐色以至黑褐色不定形的病斑，病斑穿孔後落葉。一般以幼葉最容易罹病。

枝條罹病初期也呈暗綠色水浸狀，而後形成褐色病斑，由圓形至紡錘形，嚴重時病斑龜裂，乃至枝條枯死。果實被害初期也呈水浸狀，中心並有細點，以後形成綠色至紫色圓形、稍凹陷的病斑，果實成熟時病斑周緣仍呈綠色。

本病害在有強風及連綿雨季時最易感染蔓延。

防治法：

1. 設置防風林或防風設施。

2. 果樹休眠期以石灰硫黃合劑7倍防治1次。開花後使用鏈黴素(Streptomycin)溶液每隔7天防治1次，連續3次。

(二)囊果病：主要為害果實。幼果期罹病時，病果外表呈白綠色，果形急速膨大，常為健全果的5~6倍成豆莢狀，切開病果，果肉肥厚，種子萎縮。後期病果果皮皺縮，並覆有白粉(子囊層)，此後果實先端成茶褐色以至黑色，遂至落果。

本病害在高冷地區容易發生。

防治法：



——李花——

果樹休眠期除注意以石灰硫黃合劑7倍防治外，隨時把病果在未發現白粉前摘除。

(三)蟲害：常見害蟲有蚜蟲類及桃折心蟲等類，為害時期多在新梢及幼葉時，因此除在果樹休眠期以95%夏油乳劑50倍防治1次外，可在新梢長出時再以低毒性殺蟲劑防治。

金寶螺(福壽螺)危害猖獗!!

請農友們速用：
(原裝進口貨)



滅蝸牛

餌劑



趕快來除害，避免受災禍！

使用方法：

將本劑研磨成粉末或直接撒布於田間(水位需保持2公分以下三天)
或菜園溝內則可達到全面殺淨效果(每分地用藥量700~800公克)

製造廠：日本第一農藥株式會社

進口商：郁勝貿易有限公司(原為連勝貿易公司)

台北市太原路20號電話：(02) 5510669 · 5519679