

1年數次。採用“草生栽培”，可防止土壤沖刷，同時可增加土壤有機質，對樹勢強健有利。

注意病蟲防治

幼年樹注意防治春梢與夏梢的蚜蟲、木蝨（會傳播立枯病）及潛葉蛾（畫圖虫），可施用馬拉松乳劑800倍液或大滅松乳劑1,000倍液。

4～8月間，經常巡視果園，捕殺星天牛成蟲及鑽入地際樹幹的幼蟲。

為防治介殼蟲類，宜於12～1月間（未萌芽前）噴射95%夏油乳劑95倍液，並在4～5月，殘存成蟲所繁殖的幼蟲尚未長大之前，噴射大滅松乳劑1,000倍液。


5～9月間，噴射克氯苯乳劑1,000倍液等，防治銹壁蟲，以免引起象皮病（黑柑）。

立枯病（黃龍病）為害全省的柑桔類，柑類也沒有例外。尤其是麻豆鎮內的麻豆文旦，已有一半以上受感染，產量激減，品質劣化，如比重輕、糖度低、酸度高、果皮厚、果肉少。除了對輕度發病樹灌注鉑黴素及剪除病枝，以減少病原外，可多施有機肥，並於乾旱季節灌溉，使根系增加活力，有助於減輕發病程度。



不要貪便宜，有效最要緊！

買有效的農藥，才會安心。
獅馬農藥、給你有信心。



BASF



獅馬農藥