

公分。因此水稻收穫後的殘株，每隔一行，以株距20公分點播，每穴2粒。

### 三·施用殺草劑

大豆播種覆土後，立即噴施殺草劑，每公頃施用43%拉草乳劑4~5公斤，稀釋200倍，均勻噴洒於土面。夏作不整地栽培時，噴施巴拉刈液劑，每公頃3~4公升，稀釋150~200倍，與拉草乳劑混合噴洒，以後視雜草滋生情形，再噴施巴拉刈液劑，以防除行間雜草。

### 四·施肥量

肥料施用量各地不一，台東地區，夏作每公頃硫酸銨50~100公斤，過磷酸鈣250~330公斤，氯化鉀100~150公斤，播種後20天施1次。

### 五·病虫害防治

目前本省栽培大豆，最嚴重的病害為銹病。大豆病虫害的防治，不如對水稻那樣精心照顧。如果在開



二期缺水稻田栽培大豆

花前、開花後，每隔7~10天，施用1次大生45，共噴4或5次，可以有效控制銹病。但實施此種方法的農友不多，產量自然受損。現將大豆的主要病虫害及防治時使用的藥劑、時期及次數列表如後：

病虫害	使用藥劑	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時期及次數
銹病 紫斑病	80%鋅錳乃浦	2.5~3公升	400	播種後20~30天或花芽開始萌出時，施藥一次，以後每隔7~10天施藥一次，連續4次。
潛蠅類	5%二硫松粒劑	20公斤		整地前施用
潛蠅類	90%納乃得可濕性粉劑	0.5公斤	2,000	大豆發芽後3~4天施用1次，以後每隔7~10天施藥一次，連續3次。
蚜虫	90%納乃得可濕性粉劑	0.5公斤	2,000	發現蚜虫時立即防治
紅蜘蛛	50%加力可乳劑	1公升	1,000	虫害發生時，每隔7~10天，施藥一次
浮塵子， 擬尺蠖， 夜蛾及毒蛾	46%一品松乳劑	1.5~2公升		發見時立即防治

### 六·收穫

大豆莖葉變黃，少數葉片枯萎脫落，豆莢帶褐色時，收穫最為適宜。

## 農林廳免費供應 病毒腸炎疫苗

省農林廳決定提供鵝的病毒性腸炎疫苗，並將免費供應農民使用，以防止鵝病毒性腸炎再次流行。

今年3月間，本省發現幼鵝感染病毒性腸炎，鵝紛紛暴斃，尤其其中南部地區最為嚴重，農戶損失慘重，也一度使鵝市場供應失調，鵝肉價格高漲。

為了防止鵝病毒性腸炎的再次發生，現已研製成功，鵝病毒性腸炎疫苗，並將陸續分發至各有關單位，鵝場如有需要，可向鄉鎮公所登記，農林廳一律免費供應。

農林廳強調，今年由於夏季天氣燥熱，溫度高，季節性傳染病極易滋生傳染，入秋後大量小鵝孵出，如對種鵝事先實施疫苗接種，將可有效預防病毒性腸炎。