

施肥：1 平方公尺面積使用堆肥 2 公斤，或於畦土 1 平方公尺用堆肥 1 公斤及化學複合肥料 50~100 公克，充分混和作基肥。生育期間可以追肥二次，於中耕除草之後撒施於畦面或以稀釋液肥澆施。以堆肥培土覆蓋植株基部也可以。

病虫害防治

麒麟菊僅有少數病害。



其它病害：如白粉病、白綃病等偶而發生，可用多保淨、大生 400 倍水溶液，每隔 2 周散佈一次，以收防治之效。

夜盜蟲：發芽初期有夜盜蟲發生，可用土壤灌注性殺蟲劑防治。

毛虫：生育期間可用萬靈或歐殺松水溶液噴施防除。

採收與出貨

麒麟菊密穗（像棒狀般刷子）花序由頂端順次往下開放，收穫日期以由頂端開出 2~3 輪花時起，由地面處切取。種植至開花期因種植早晚而異，一般 80~120 天。

麒麟菊切花分級按花莖的長度、粗細及開花的程度區分，包裝以 10 支捆作一束，裝箱出貨。

採收後植株管理：收穫後宜及

菌核病：這是比較頑固而難以控制的病害，因此預防措施需完善。即避免於種植蔬菜後連作，因感染麒麟菊的菌核病原菌與甘藍菌核病相同。此外於發病初期也應當將染病株數草除去。此病在 20~25°C 時容易發生，應以大克爛 800 倍水溶液作預防性數次散佈。有感染或疑有感染的枯株於貯藏中或繁殖間務需剔除。

早追施肥料，以強壯母株，使地下球根肥大。此外，為免病害發生，可用大生可濕性粉劑 400 倍液，每隔 2 周散佈 1 次。

麒麟菊切花採收後，植株約經 2 個月繼續生長，即自然進入生長停止呈休眠狀態，此時停止澆水，直至地上部枯黃後，再將地下根掘起。掘起後應以水沖洗根部，使附土流失，並於陰處風乾至表面無水程度，然後再行分株，並將大、小根分類貯放，罹病株淘汰。

地下根貯藏：為打破休眠，並貯存至栽培適期再種，麒麟菊的地下根需作適當的貯藏。根據日本試驗資料顯示，最優良而簡便的貯藏法是用塑膠袋包裝以防失水，並冷藏於 0~5°C 之下。



泰 國

T.C.O.

純正

蓖麻籽粕

原裝進口

最佳有機質肥料

省工・省本・多利

土壤改良 兼施肥

含有成分：
氮 5.5~6.5%
磷 2%
鉀 1%
有機物 82%

適應作物：
蘋果、梨、桃、葡萄、
柑桔、蕃石榴、蘆荀
枇杷、檸果、荔枝、蓮霧
茶樹、蕃茄、草莓、菸草
蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、蘿蔴、花卉。

經銷處：

(045) 874571 胡壽藍
(045) 329366 撒寶公司
(045) 989774
(048) 321833 頂新公司
(048) 337127

台灣總代理：
泰坦企業有限公司
(02) 5361648~9