

着。如缺乏明顯的毒牙孔痕，在20分鐘內無局部疼痛、水腫、麻木或無力現象，可判斷並未受毒蛇之害。如果蛇種不明，可將蛇打死，帶到醫師處證明。

### 保持冷靜

被咬者應保持冷靜及堅強，儘可能的減少毒液的吸收並將其從組織中除掉。

病人應立即休息，且將被咬的肢體固定不動，以減少毒液傳播。

### 綁止血帶

如受傷部位方便，應用一條寬的止血帶，綁在傷處近心端上數公分。緊度約僅可讓一根指頭勉強從下面通過，以阻止淋巴液回流，但並不阻斷血液回流。

止血帶應每隔一小時調整一次，以使逐漸增加的腫脹不致造成過緊。

### 吸出毒液

除非病人在15分鐘內可送達醫院，否則有必要將傷口切開並吸出毒液。刀子應先消毒，在每一毒牙痕跡上作一1公分的線狀切口，深度約0.5公分，用吸奶器或加熱的廣口玻璃瓶吸取毒液。

如果沒有這些裝備，而口腔內並無破損，且無蛀牙，也可用嘴吮吸。

吸毒液至少要1小時或等注射過抗毒蛇血清後，才能停止。

傷口切開的工作，對被毒蛇咬傷的病人很重要，應盡力為之。如果實行得快，至少可吸出皮下組織50%以上的毒液。

### 不可冷敷

雖然冰塊可減輕疼痛且減緩淋巴液流動，但不能對抗毒液的毒性

，且可能使已受傷的組織引起缺血，而造成不能恢復的傷害。因此，不可使用冷凍療法急救。

### 立即送醫

治療休克及呼吸困難，必需立刻送到醫院注射抗毒蛇血清。因為抗毒蛇血清是唯一專門對付蛇咬傷中毒的辦法。

靜脈內注射抗毒蛇血清的效果快而有效，局部注射的方法較不適當。注射足量抗毒蛇血清後，傷者的症狀常迅速改善。

### 預防方法

在毒蛇常出沒的地區，應穿着長褲、長靴，或綁腿及戴手套。每走一步都要看清所要到達之處。到偏遠地方時，鋒利的刀片、止刀帶、吸毒器、無菌的急救裝備，及抗毒蛇血清均應攜帶，以便行緊急救治。

**樂敏牌**

●強力・輕便  
●省油・耐用

新發售  
最大5.0馬力  
EY20D(直結形)

製造元：  
富士重工業株式会社

經銷處：  
樂敏有限公司

農業、產業  
機械之動力源

汽油、柴油  
二衝程、四衝程  
一馬力至二十馬力  
各馬力齊全

兼售ROBIN  
汽油及柴油發電機  
汽油: LG072 LG102 LG152  
RG121C RG201D  
RG301D RG402D  
RGX305D RGX405D  
RGX505D  
柴油: RGK161 RGK301D

台北市峨嵋街68號2樓  
TEL. 3613541~3