

趕快帶孩子接種小兒麻痺疫苗

劉玉燕

小兒麻痺流行，已經引起許多家長的恐慌，連日來各衛生機構，接獲許多家長的查詢，擔心因自己疏忽而使孩童罹患小兒麻痺。

但是醫護人員發現，很多家長根本不知道該讓孩子接種疫苗。由於這次小兒麻痺症的流行，使很多父母親警覺到，按時接受預防注射的重要性。因此奉勸各位不要因一時疏忽或偷懶，而使兒童感染了可怕的傳染病，以致後悔莫及。茲介紹小兒麻痺的傳染途徑、潛伏期、症狀及預防方法

小兒麻痺的病原體是脊髓灰白炎病毒。

傳染源是感染者的咽喉分泌物及糞便。

傳染途徑是被病人與帶菌者排泄物所污染的水及食物。接觸病人

及其被褥，衣服、飲食器具，日常用具。另外由蒼蠅、蟑螂為媒介，而使病菌經過健康者的口腔侵入而傳染。

侵入部門為消化器官

潛伏期，2~35日（普通7~14日）。

症狀：發燒，四肢痛，手肢麻痺。

預防方法：預防病菌侵入體內，避免攜帶兒童到公共場所，更忌諱亂吃東西，以減少感染的機會，改善環境衛生，消除蒼蠅、蟑螂等。

②增強個體抵抗力，給予預防接種。

小兒麻痺的疫苗是活性減毒的小兒麻痺病毒。

接種對象：凡出生滿2個月的嬰兒都應接種，接種方法是口服。

接種劑量：

①初種3劑，每劑2~3滴，間隔6~8週，

②追加：初種3劑完成後1年，再一補劑即可，

反應：接種後幾乎很少發生反應，如果有的話，症狀是噁心，嘔吐，發燒、腹瀉。

應注意事項：


務必確定已服下。因為嬰兒還小、極易從口角流出。口服2劑其效力達90%以上，再服第3劑、其效力更增加。每劑的間隔在半年內都有效、不需重服。

沙賓疫苗（小兒麻痺症疫苗）的效果相當好，家長應該相信它，只要按時，按次數接種，不必擔心會感染小兒麻痺。

大眾的認同




信譽的標誌



水田作業、中耕除草的綜合機

THR 700型 本機裝設有前進及後退檔



THP 150S型為水田專用機

適合下列各用途：

- 水田整平 ● 犁田邊 ● 裝設高壓噴霧機
- 蔗園、菜園、菸園中耕培土 ● 普通旱作、作畦、培土、簡單、快速

信先農業機械股份有限公司

總公司：台北縣三芝鄉茂長村2之1號 TEL: 6363116~8(三線)

高屏總代理：象田企業公司

屏東市廣東路49號 TEL: (087) 226259-229259