

不論整地或不整地栽培毛豆，播種後必需馬上噴洒殺草劑，然後蓋稻草，藉以減少土壤水份的蒸發和雜草衍生。

播種：選擇飽滿肥大的種子，每分地約需種子10~12公斤。毛豆在高溫期栽培時，從播種到發芽這段期間，如果雨天過久則容易腐爛。各地播種適期：

南部：春作在1月下旬~2月下旬，夏作在6月上旬~6月下旬，秋作在9月中旬~10月中旬。

中部：春作在2月中旬~3月中旬，夏作在6月下旬~7月下旬，秋作在9月中旬~10月中旬。

北部：春作在2月中旬~3月中旬，夏作在7月上、中旬，北部因為秋冬季節氣溫低、雨量多，並不適於秋作。

整地栽培時，可先開植溝，然後依行距30~35公分，株距10~15公分播種，播種後再覆土1.5~2公分。

施肥：每分地施用800~1,000公斤堆肥作基肥，當毛豆株高約20公分或本葉2、3片時進行追肥，追肥的施用量是每分地硫酸銨20公斤、過磷酸鈣30公斤、氯化鉀20公斤。

施追肥時，應避免在清晨或傍晚有露水的時候，而且，施肥後要立即用稻草製成的梳把替毛豆「擦嘴

巴」，掃落附在葉面上的肥料，以免燒傷葉片。

灌排水：和一般豆類一樣，毛豆在生育期間要注意灌水及排水。

除草：毛豆在播種後3天內，就得進行除草工作，除草時可任選下列一種殺草劑。

藥劑名稱	每分地施藥量	稀釋倍數	施藥方法和時期
30%福泰芬乳劑	1公升	100	播種覆土後噴於土面
75%大克草可濕性粉劑	1公升	100	〃
50%理有龍可濕性粉劑	0.12~0.15	800	〃
25%達乃安乳劑	0.3公升	350	〃
18.6%欄本乳劑	0.8~1.2公升	100	〃
43%拉草乳劑	0.4~0.5公升	200~300	〃
86%五氯酚納可濕性粉劑	1.2~1.5公升	80~120	〃
55%佈殺丹乳劑	0.8~1公升	100~150	〃
33%賜得圃乳劑	0.3~0.45公升	350	〃

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

◆詳細資料歡迎函索◆

有機質 磷鉀肥
魚精 **開花肥**
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大
美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 **花寶(HYPONeX)系列!!**

花寶二號

20-20-20

促進果實肥大 糖度增加

花寶三號

10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》
——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元[®] CALGEN
カルゲン

日本ネオゲン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司

Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：101360

電話：(02) 831-3302

電話：(042) 223374