



麗格秋海棠

吳昭祥

施肥·開花

繁殖方法

麗格秋海棠的葉插法一般在10~12月間實施，剪下整片葉子，留2~3公分葉柄，插於砂或蛭石中，約2~4周可發根並萌發不定芽，兩個月左右即可移植上盆。上盆後經培養3~4個月，即可生產4寸盆的成品上市。

由於葉插繁殖成活率與日長相關，所以如使母株在短日之下栽培，採穗後將穗葉改在長日處理下，繁殖率最高。相反的，如母株在長日下生長，採穗後在短日下發根，繁殖率幾乎為零。

為防止葉插期間有腐爛現象發生，插床最好灌注萬力2,000倍液，並隔離栽培母株。

麗格秋海棠的頂芽插法較適合

於長日之下利用，如在短日季節扦插，最好補充照明作長日處理。此外頂芽插有一特點，較怕潮濕，所以通常是以底部灌水法，不沾濕葉片，以預防腐爛發生。

栽培介質

麗格秋海棠喜愛通氣良好的介質，而在北歐國家所生產的泥炭苔品質優良，所以在瑞典栽培有完全

☆品質保證 ☆ 原裝進口 ☆

三寶靈

サブリン

- ①微量元素最齊全。
- ②成份含量最充足。
- ③葉面撒佈最適宜。
- ④含有N.P.K.三要素。

每罐容量：700g

用於蔬菜、瓜果、果樹、水稻，
有明顯的生長效果。

保收多

Vitaseven

粒狀綜合微量要素肥料

- ①水溶性，作物吸收性極高。
- ②使用方便，經濟實惠。
- ③減低成本，增加產量。
- ④含有三要素。

每包容量：20kg

用於蔬菜、瓜果、果樹、梨、蘋果，
有明顯的生長效果。

製造工廠：日本ダイヤケミカル株式會社

總代理：B.V.I. 郁勝貿易有限公司

台北市太原路20號 TEL:5510669

※徵求人才：本公司急徵推廣技術員，農專畢可待遇從優，來函應徵

用泥炭苔栽培的情形。此外也有用
 $\frac{1}{2}$ 泥炭苔與 $\frac{1}{2}$ 蛭石或壤土
 混合調配栽培介質的。

在美國，栽培麗格秋海棠多以
 50%泥炭苔與50%珍珠石混合調製
 。酸鹼度均調至 PH5.0~6.0。

肥料技術

麗格秋海棠對肥料的需求量不

很大，一般以緩效性與速效性液體
 肥料配合使用。以泥炭苔為栽培介
 質為例，每10公升土中須加：

石灰55公克、硫酸鎂 5.5公克
 、硝酸鉀 2 公克、過磷酸鈣 3.5公
 克、緩效性肥料 (14-14-14) 4.5
 公克、微量元素肥0.3公克，並於生
 育期間，每10天施用 1 次低磷肥液
 體肥料。為了方便起見，也可提高

緩效性肥料的用量，減少追肥使用。

病蟲防治


麗格秋海棠栽培上較常發生的
 病虫害有以下數種：

白星病：葉片上有直徑 0.2公
 分的褐色斑點，中間有白色菌絲。
 防治可用大生（錳乃浦）、蓋普丹
 、萬力等殺菌劑。

白粉病：秋天易發生，葉面密
 佈白粉，可用萬力、甲基多保淨防
 治。

灰霉病：梅雨季或秋冬冷涼潮
 濕，日照不足時，花梗及莖葉上密
 佈灰霉，可用好速殺、甲基多保淨
 防治。

細菌性斑點病：為麗格秋海棠
 最嚴重的病害，在高溫多濕狀況下
 容易發生，症狀為葉片有直徑約 2
 公分的褐色至黑色斑點，防治可用
 銅水和劑、鏈黴素防治。



左：葉插的狀態。中：葉插後 5 周發根情形。

右：葉插後 2 個月後，於育苗盆發育情形。

Ascophyllum nodosum

挪威原裝進口來台
 現貨供應……。



- 最新開發促進植物體
 高蛋白化作用。
- 純天然有機質，
 含有氨基酸、維他命、醣類
 等60種以上微量元素。

一、挪威海藻產品，提供您高收益的農業……（アルギット農業資材）。

▲ 海藻肥

アルギット
 ALGIT

培養活性的土壤，健康的作物。可在作物中耕時間
 或作物移植，定植時均可使用，每分地25~50kg 施
 用，穴置每株約0.5~1公斤施放。

▲ 海藻精

アルキフェート
 ALGIFERT

特殊肥料葉面散布，稀釋5000至10000倍，使用係純
 天然性（高蛋白化）有機質物，可與殺蟲劑、殺菌劑
 混合使用，半小時內植物可完全吸收。

二、最新科技的結晶產品。

▲ 安樂力肥

R.B.パワー

植物體（樹液）PH之調整，
 促進根、芽之活動

▲ 神協來肥

シキョーライト

來自三仟萬年前天然產品，
 促進細胞粒腺體機能。

遠東區總代理：
 台灣區總經銷：



神協産業株式會社
 松洲化學工業社有限公司
 豐原市豐勢路944號TEL (045) 224792

誠徵縣市經銷商
 （詳細資料備索）



花開過後將花梗
由株基部刮掉

莖腐病：植株與地際部有水浸狀暗紫色病斑，防治需事先施行土壤消毒。

蝸牛：麗格秋海棠並無特殊虫害，但需防蝸牛食害，可用殺蝸劑或誘餌防除。

據美國某專業栽培者的經驗，如在麗格秋海棠栽培期間經常注意摘除枯葉，並於上盆兩周後，用利刃切除老葉，可減少腐爛機會，對



莖枝伸長的老株
病害控制很有幫助。

開花調節

麗格秋海棠大多品種屬短日性，也就是在日長9小時的短日下，持續2~3周可達花芽分化完全。

一般強生長勢品種，一上盆後隨即以短日處理，而弱生長勢品種則於上盆後，先經1周長日以供營養生長，再予短日促進花芽分化。




將老株修剪之後

少數品種對日長稍不敏感，有些日長中性現象。

如果在短日處理期間受長日打斷，則短日處理須作滿3周才能花芽分化完全。一般植株在短日處理完全後，在長日下約6周可開花。



**保護農友之健康
農藥專用口罩**



專作口罩外銷10年

主要外銷：
日本農藥株式會社、
歐洲、東南亞。

特自進口活性炭

用途：


- 稻穀、蔬菜噴農藥
- 果園噴藥劑
- 園藝噴藥灑
- 作業場所防塵

新元實業有限公司

台北市石牌立農街2段202巷11號
TEL：(02) 833-2317 · 836-0789
信箱北投2-112

構造簡介：

- 特利可得 Toned
- 泡棉 Polyurethane
- 不織布 Non woven fabric
- 活性炭片 5mm Activated carbon film
- 泡棉 Polyurethane



SC-50TYPE