



花開過後將花梗
由株基部刮掉

莖腐病：植株與地際部有水浸狀暗紫色病斑，防治需事先施行土壤消毒。

蝸牛：麗格秋海棠並無特殊虫害，但需防蝸牛食害，可用殺蝸劑或誘餌防除。

據美國某專業栽培者的經驗，如在麗格秋海棠栽培期間經常注意摘除枯葉，並於上盆兩周後，用利刃切除老葉，可減少腐爛機會，對



莖枝伸長的老株
病害控制很有幫助。

開花調節

麗格秋海棠大多品種屬短日性，也就是在日長9小時的短日下，持續2~3周可達花芽分化完全。

一般強生長勢品種，一上盆後隨即以短日處理，而弱生長勢品種則於上盆後，先經1周長日以供營養生長，再予短日促進花芽分化。




將老株修剪之後

少數品種對日長稍不敏感，有些日長中性現象。

如果在短日處理期間受長日打斷，則短日處理須作滿3周才能花芽分化完全。一般植株在短日處理完全後，在長日下約6周可開花。



**保護農友之健康
農藥專用口罩**



專作口罩外銷10年

主要外銷：
日本農藥株式會社、
歐洲、東南亞。

特自進口活性炭

用途：


- 稻穀、蔬菜噴農藥
- 果園噴藥劑
- 園藝噴藥灑
- 作業場所防塵

新元實業有限公司

台北市石牌立農街2段202巷11號
TEL：(02) 833-2317 · 836-0789
信箱北投2-112

構造簡介：

- 特利可得 Toned
- 泡棉 Polyurethane
- 不織布 Non woven fabric
- 活性炭片 5mm Activated carbon 5mm
- 泡棉 Polyurethane



SC-50TYPE