

廢水影响毗鄰稻作 應負損害賠償責任

宜蘭縣
五結鄉秀新
村新店路

105號張柏郎先生問：

我耕作兩公頃水田，位於灌溉溝及排水溝邊。毗鄰有一個3公頃大養蝦池。養蝦池排出鹼性廢水，常使我家水稻枯黃或淹死，嚴重影响稻谷產量，屢催他們改善，都置諸不理。請問：

- (1) 是否可以向他們請求賠償？
- (2) 請求賠償，該向那個單位辦理？

高瑞錚律師答覆：

(1) 因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項上段有明文規定。如能證明你家水稻所受損害與他們排放的劣質池水有相當因果關係，自得依法請求賠償損害。

- (2) 你可向縣政府、鄉公所或農會陳情，請求責



令養蝦池定期改善，並或派員到場鑑定責任，如仍不獲解決，再向法院提起侵權行為損害賠償責任。

雲林縣虎尾鎮頂南 260號林清綢先生問：

甲旱田與乙旱田相鄰。12年前，甲在他的土地上建築一間農具室。現在每逢下雨，雨水會沿着屋頂注入乙旱田，乙乃要求甲設法使雨水不滴入乙旱田。其實這地方除大雨連綿之時外，平日下雨滴水，對乙的作物並無影响，請問有關法律如何規定？

高瑞錚律師答覆：

民法第777條規定，土地所有人不得設置屋簷或其他工作物，使雨水直注於相鄰的不動產。來函情形，某甲應於農具室屋簷增加集水裝置，不得使雨水直接注入於某乙的土地。

**屋簷雨水直注鄰地
應設集水裝置改善**

應防呼吸器病的發生，平時應防緊迫。

健康的鵝應具備頭小，且胸部至腹部充實飽滿，肌肉結實，及骨骼健壯等條件。如果發育遲滯，活力不佳的，應淘汰。產卵率受飼養管理、環境、飼料等因素影响，夏天產卵率下降，冬天高。需靠經驗才能順利飼養。

鵝鵝主要疾病及防疫對策與雞相同。

雌雄鑑別，母鵝毛色較淺，頸羽有點狀毛色，雄鵝毛色較深咖啡色，頸羽無點狀，鵝鵝雌雄發育於5周齡前無明顯差別。初飼時雄6.5公克，雌6.8公克，性成熟時，雌約115~135公克，雄約95~108公克。

孵化時間15天，孵化溫濕度與雞相似，平面式102°F，立體式99~100°F。種卵應選擇卵型大小、顏色、卵殼、構造大致相同的。

鵝蛋以打計價，婚喪喜慶多用，加工成罐頭，市面上到處可見，一般養鵝農戶均將鵝蛋售給飼料商，或經營鵝鵝之孵化場，採一貫作業，銷路以煮熟剝殼出售，製成鵝鵝皮蛋、罐頭等。

目前養雞業蛋價不穩，致鵝鵝蛋亦受影响，以前每打12粒售價10元，如今改為論斤兩交易，除非宴客，主婦們均以雞、鵝蛋便宜而很少問津，因此銷路以加工皮蛋或罐頭較多。價格與加工廠交易，隨市場產量多少而起落。(唐清苓)

台中和16號 再生栽培法

貴刊32卷第6期介紹的台中和16號水稻，可否行再生栽培？(南投縣草屯鎮北投里北投路265巷2號陳接姚)

台中和16號經試驗結果，證實可行再生栽培。再生稻最簡單栽培方法為，自黃熟期至收穫後10天內，實施間斷灌溉，保持土壤濕潤，此種處理法可使再生率最高。水稻收穫後，收集及火燒稻草，隔天再灌水。

再生芽長出後，施用全部氮肥的30%、全部磷肥及50%的鉀肥。再隔20天，施用全部氮肥的50%及50%鉀肥。幼穗形成期，施用剩餘的20%氮肥。(林再發)

