

光澤變壞，導致茄皮硬化。但過於潮濕，則根莖不透氣，容易腐爛。通常灌水時，只要水達60%高即可，保持土壤濕潤狀態，然後再予排水。

### 病虫害防治

(1)疫病：在高溫多濕的環境下，最易感染早疫病或晚疫病。防治方法是清除患病的葉、株、果，並避免連作。或以74.7%鋅鋁粉克可濕性粉劑400倍稀釋液防治，每隔2周噴射1次。如遇連續下雨，應縮短施藥時間，以達效果。

(2)綿疫病：長期潮濕時最易發生。此時病果呈大形褐斑，上有白色菌絲，然後逐漸腐爛和落果。生育期每隔14~20天噴1次39.5%的四氯丹可濕性粉劑800倍液防治。

(3)紅蜘蛛：高溫乾燥時最易發生。病葉漸變成白色，最後枯落，可使用25.5%克氣本乳劑1000倍，每隔7~14天防治1次。紅蜘蛛類極易產生抗藥性，藥劑應經常更換，以收效果。

(4)番茄夜蛾：在葉下和花蒂附近產卵，孵化成虫後，食葉片或潛入果實，蛀食為害。使用10%百滅寧

乳劑2000倍，每隔10天防治1次，效果很好。

(5)薊馬：為害茄果表皮，商品價值喪失。使用美文松乳劑800倍，每隔5~7天施藥1次，效果尚為理想。

(6)青枯病：高溫而土壤過於乾燥時容易發生。病菌在根部傷口為害，經導管到莖、葉部，使莖內部褐化腐敗，植株急速凋萎。如將株莖切斷，用力擠壓，會滲出白色粘性分泌物。尋找抗病性砧木再嫁接及土壤消毒，可減少發病率。

### 3月起採收

麻糬茄在果實肥大而成熟時採收，一般從3~5月就開始採收。起初每隔3夜4天採收1次。端午節是茄子盛產期，因氣候溫和，每隔2夜3日採收1次，延至秋風起（9月中旬）才逐漸停止。每分地可產3,000~4,000公斤。

麻糬茄是一種高經濟價值的作物，去年張金藤種植的茄子收成不錯，扣除肥料、農藥、租金、工資等費用後，每分地約有6萬元的盈餘，對農民而言，將是一項令人重視的作物栽培。




樂敏牌

●強力●輕便  
●省油●耐用

新發售

最大5.0馬力

EY20D〈直結形〉



農業、產業  
機械之動力源

汽油、柴油  
二衝程・四衝程  
一馬力至二十馬力  
各馬力齊全

兼售ROBIN

汽油及柴油發電機

汽油:LG072 LG102 LG152

RG121C RG201D

RG301D RG402D

RGX305D RGX405D

RGX505D

柴油:RGK161 RGK301D

製造元：

富士重工業株式會社

經銷處：

樂敏有限公司

台北市峨嵋街68號2樓

TEL. 3613541~3