

好壞，對將來的產量有密切關係，日前大湖鄉育苗方法如下：

直接育苗法：在栽培本圃於的草莓採收期結束後（5月底6月初）慎選無病虫害、線虫、紅蜘蛛為害的株做母株。

至5~6月份起，母株不斷發生匍匐莖，此時除去畦面上的覆蓋物（塑膠布或稻草），每畦犁去一行，保留一行，即時整地、耕耘做引蔓工作。

每一母株留2~9條匍匐莖，母條莖再留3~4苗（2、3苗最好）。育苗期間注意灌溉排水，施肥工作（通常育苗所需肥料，每分地堆肥2,500公斤，尿素15~20公斤，過磷酸鈣45~50公斤，氯化鉀15公斤）。

移植育苗法：將5、6月間所長匍匐莖第1苗，就地定植於塑膠鉢中，並隨時摘除第2節苗。

7月中旬，從塑膠鉢移植於苗圃育苗（苗圃於7月上旬，用必速滅600倍液噴施、消毒，然後用塑膠布覆蓋，1星期後再消毒1次，隔1星期後用耕耘機，耕耘耙平做畦。

畦面寬1公尺，每畦種1行，株距30公分，將鉢

中苗移植，植後約2星期噴施24%萬強（歐殺滅）1,000倍液或甲基巴拉松1,000倍3次防除葉芽線虫，第2次孫走莖即開始發生，每株平均約有10~15莖。

平均溫度在24°C以下為草莓的種植時期（草莓生育最適溫度為17~22°C），因此種植時期以10月上、中旬為最適宜。

防治地下害虫

用10%毒線虫（芬滅松）粒劑（此藥為系統性殺線虫劑），每10公畝（1分地）施用3~4公斤，種植前在畦上開溝15公分條施，經覆土後即可種植。

作物根部吸收芬滅松粒劑後，由導管送至莖葉，非但能防治根部線虫，連莖葉部份的吮葉性寄生虫（野虫、介殼虫、紅蜘蛛、薊馬等）及土壤中的地下害虫（夜盜虫、象鼻虫、雞母虫、螻蛄等）均有優異的防治效果。

掘苗

草莓苗的優劣，對產量影响很大，所以掘苗時不



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

（殺紋寧・日名：タチガレン）

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害（凍傷）!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

用立枯靈，確實防止立枯病，及立枯性腐敗症之發生。
用立枯靈，可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷。
用立枯靈，可增強根部活力，促進生長確保培育出健康苗。
用立枯靈，能促使移植後提早成活並使生長力旺盛。
用立枯靈，安全又簡便，可與他種農藥混合使用。

國外資料（僅供參考）

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、菌軟腐病。



台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9



總經銷 實昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414
7050155