

條播每公頃播種量60~80公斤，撒播為100~120公斤，但千粒重較重，發芽率低，分蘗較少之品種，看天田等的播種量，可酌量增加。

肥料量及施肥方法

施肥量、施肥時期，品種的耐肥性，對於大麥產量及品質的影響很大，一般三要素施用量如下：

肥料要素	施用量（公斤／公頃）		
	基肥	追肥	合計
氮素	60	20	80
磷 酐	70	—	70
氧化鉀	60	—	60

若整地播種，基肥可於播種前施用。若行不整地撒播，基肥可於播種後約7~10天才施用，即已萌芽長出2~3個葉片時施用。追肥於播種後約第25天左右施用。氮素若分施多次，不但可使產量增加，種子蛋白質含量也隨之增加，因此若供為食用或飼料用，氮肥可酌量增加及分施，但若供為啤酒原料，氮肥切忌增施或分太多次施用。

中耕培土

不論整地條播、整地撒播或不整地撒播，田間如有闊葉草發生，可於追肥前約播種後20天左右，施用2,4-D或草霸王等殺草劑除之。

條播栽培者，若勞力充足，可行機械中耕培土及除草，以防止倒伏及無效分蘗，使出穗整齊。但若勞力不足，不行中耕培土也可。

撒播栽培區，由於沒有行間可行，因此不須行中耕培土，但切忌種植高株品種，避免倒伏。

灌溉排水

播種後須引水灌溉，灌溉水量視土壤質地及滲透性而定，一般以灌水後12小時，土面呈無積水狀態為標準。

大麥屬於旱作，生育期間切忌沒水。若雨量多，應注意排水，但在乾旱時期，約每半個月灌溉一次，使田面濕潤即可。

成熟後期應停止灌溉，以促使早日成熟。嘉南地區冬季乾旱，應適時灌溉。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號


立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

*** 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 ***

徹底消滅土壤病菌



培育健苗、必備良藥



台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司
1992-82 台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414・7050155