

20世紀80年代最新系統性低毒綜合殺蟲劑
防治葉面與地下害蟲，線蟲，控制毒素病
粉劑、粒劑、乳劑、可濕性粉劑

FMC® 出品

新好年丹[®]

Marshal[®]

美國 FMC 公司繼
「好年冬」農藥後
最新發明之專利藥劑
中華民國發明專利15年

經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

R 係註冊商標證號碼第132819號與第132820號

新好年丹類綜合性殺蟲劑政府推廣之使用方法及適用範圍

藥劑別	使用範圍	使用方法(每公頃每次用藥量)及注意事項	
1 % 粉劑	落花生 根瘤線蟲	200 公斤 / 公頃	1. 播種同時植溝處理。 2. 種植當日開溝15公分深施之即可播種。
	水稻 褐飛虱	50 公斤 / 公頃(次)	採收前10天停止用藥。
2 % 粉劑	水稻 負泥蟲	40 公斤 / 公頃	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後田間密度尚高，隔15天再施藥一次。 2. 分蘗盛期以前使用。
	褐飛虱	40 公斤 / 公頃(次)	採收前20天停止用藥。
3 % 粒劑	水稻 黃苗箱蟲 毒葉病	120 公克 / 每育苗箱	於播種時均勻拌上施用20公克，機械插秧前24小時再施用100公克，並灌水至飽和狀態。
30% 可濕性粉劑	水稻 褐飛虱	1.5 公斤 / 公頃(次) (800倍)	採收前20天停止用藥。
40% 可濕性粉劑	柑桔 蚜蟲	2 公斤 / 公頃(次) (1200倍)	1. 於春、夏芽萌發之前，若發生蚜蟲類，每10天施藥一次，共施藥二次。 2. 採收前20天停止用藥。
	水稻 負泥蟲	0.8~1.2 公斤 / 公頃 (1200倍) (次)	1. 水稻分蘗期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔15天再施藥一次。 2. 分蘗盛期以前使用。
48.34 % 乳劑	水稻 褐飛虱	1.2 公升 / 公頃(次) (100倍)	
	西瓜 薊馬	0.6~1.2 公升 / 公頃 1000~1500 倍	於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續四次。
	柑桔 薊馬	1~2 公升 / 公頃 1000 倍	開花授粉後，於落花三分之一時及落花後兩星期內各施藥一次。
	檸檬 薊馬	1.5~2 公升 / 公頃 1000 倍	開花結果後每隔10天噴藥一次，連續五次以上。



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(043)393201-3



® 台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division