



## 團頭魴飼養

**問** (1)我的池子沒挖深下去，只用築土堤方式。這種水池與挖深下去的水池，用來養殖魚蝦有何差別？

(2)團頭魴（又稱武昌魚），假使以麥片、空心菜兩種配合投飼，其成果如何？

(3)武昌魚的肉質如何？是否值得飼養？

(4)水深4台尺時，以武昌魚、泰國蝦混養，放養比率1分地各放若干？何月份放養最適宜？泰國蝦放養幾個月可捕撈出售？（屏東縣高樹鄉新南村興店路20~30號黃兆良）

**答** (1)池塘依注水情形開挖。一般分為浮池及沈池兩種，在養殖使用上沒有差別，只是前者池水面積利用率較高而已。

(2)生麥片消化吸收率只有50%，蒸熟者可達80%，配合空心菜，效果尚可。

(3)團頭魴肉質鮮美，但有暗刺，可以取代部份養殖魚類。與蚬、泰國長臂大蝦混養最佳。

(4)須先決定團頭魴、泰國蝦何者做為養殖主體，再行決定比率。前者全年可放養，而後者在3月份放養為宜，飼養6個月可收成。1分地前者放1,000尾，後者放1,500尾。（余廷基）



## 農藥的稀釋

**問** 近日南部蔬菜流行病虫害，我用雨水和農藥混合噴洒。請問其與用清水混合噴洒的效果有何差別？

農藥和混濁的泥水混合噴洒，其效果又如何？（台南縣下營鄉中營村319號朱福春）

**答** 除粉劑、粒劑外，大部份農藥使用時，均需要用水來稀釋，而水質的好壞，影響施藥後的效果至大。因農藥是1種化學物質，如所用水質不佳，將會發生變化。純雨水應是中性，稀釋農藥最好，但來源有限。通常能有清水使用將可確保藥效。

混濁水千萬不要用（包括工廠廢水），否則不但無效，有時恐發生藥害。據分析，本省主要河川水質偏向鹼性，如稀釋殺虫劑（有機磷劑是酸性）時，應先在水中加入少許食醋或微量煤油等，可減少分解，提高藥效。（方新政）

## 蠔菇變形菌為害

**問** 培養蠔菇，如何預防病害？菇邊變黃並有明顯紋路，請問是何病害？（台中市北屯路419巷107號蕭秋正）



**答** 蠔菇培養時，對病害的預防應注意栽培場所的清潔及雜菌包的清除，以防重複感染。來函所提的病害可能為變形菌（粘菌），此菌主要特性為具迷宮形紋路，而造成菇體腐敗。一般並無適當的藥劑可防治，主要仍在於選擇良好的菌種及清除雜菌。（廖英明）

## 鱸魚飼養

**問** 我打算在山坡地挖築魚塢兩甲（分二口），以地下水養殖紅目鱸，拜讀「水產養殖」後，仍