

芬佈賜可濕性粉劑 (Fenbutatin-oxide)

「芬佈賜」是硯設公司 (Shell Chemical) 產品 (試驗申請人：麒麟公司)，此種殺蟎劑，在美國商品名稱爲Vendex，其他國家則稱爲Torque。

1. 有效成分與理化性狀：農藥原體爲白色結晶粉末，熔點 138~139°C，不溶於水，微溶於有機溶劑。成品農藥爲50%可濕性粉劑，是類白色粉末。

普通名稱	劑 型	有 效 成 分	含量%	商 品 名 稱
芬 佈 賜	可濕性粉劑	Di [tri-(2-methyl-2-phenyl-propyl) tin] oxide	50	Vendex

2. 使用方法及範圍：

農 藥 名 稱	使用 方 法		使用範圍	注 意 事 項
	每公頃每次用藥量	稀釋倍數		
50%芬佈賜 可濕性粉劑	1.3公斤	1,500	梨葉蟎	一、於葉蟎發生初期施藥，以後每10天施藥1次，連續3次。 二、採收前10天停止用藥。

3. 毒性：「芬佈賜」有效成分急性經口毒性LD₅₀對鼠2,631毫克/公斤。

滅賜克可濕性粉劑 (Methiocarb)

西德拜耳 (Bayer) 公司產品 (試驗申請人：中德公司)，爲氨基甲酸鹽類殺虫劑，具有消化中毒與接觸毒性。

1. 有效成分與理化性狀：純品爲白色結晶粉末，農藥原體的熔點爲 117~118°C，於鹼性溶液中易於水解。

普通名稱	劑 型	有 效 成 分	含量%	商品名稱
滅 賜 克	可濕性粉劑	3,5-dimethyl-4-methyl-mercapto ¹ phenyl-N-methyl-carbamete	50	mesurol

2. 使用方法及範圍

使用 方 法		使用範圍	注 意 事 項
每公頃每次用藥量	稀釋倍數		
1~1.7 公斤	1,000	西瓜淡色薊馬	一、於薊馬開始發生時，卽行施藥，每週1次，連續不得超過4次。 二、採收前3天停止用藥。

3. 毒性：急性經口毒性LD₅₀對鼠100毫克/公斤。可應用硫酸阿脫品 (Atropine sulphate) 爲解毒劑。