

適度灌水 收穫前2週 停止灌水

洋葱結球肥大期的灌水很重要，宜視土壤性質加以適當灌水。

如灌水不足，土壤太乾時，將阻碍葱球的肥大，產量會減低。

如灌水過多，而又浸水時間過久，則會阻碍根部發育，甚至引起根部腐爛。

如灌水間隔時間太長，而在長期乾旱之後，遇到降雨或灌水過多，則易引起裂球。

通常洋葱的肥大發育末期，葱球接近倒伏時，灌水量宜減少。等到開始倒伏時，就應停止灌水。因此原則上，採收前2星期停止灌水，使土壤乾燥，促進休眠，減少球內水分，收穫後才能耐運輸，而且也不會減少產量。

如果洋葱進入成熟期時仍繼續



灌水量多，積水後易發生病害。(曾紹均)

灌水，不但會延遲成熟期，增加分蘗和分球，更會促使軟腐病發生，同時球內水分太多，容易腐爛，收穫後葱球失重太多，不耐貯運，這點須要特別注意。

徹底防治病虫害

洋葱結球至倒伏期間，因植株

生育已轉衰弱，同時天氣也已轉暖，因此病虫害最易發生，所以應徹底防治病虫害。

較常見的病虫害有黑斑病和薊馬，其防治方法可按照農林廳編印的植物保護手冊內容辦理，以減輕損失，提高收量和品質。

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

有機質 磷鉀肥
魚精 **開花肥**
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——落果良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 **花寶(HYPONeX)系列!!**

花寶二號

20-20-20

促進果實肥大 糖度增加

花寶三號

10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》

——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加

強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
カルゲン

日本ネオケン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司

Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：101360

電話：(02) 831-3302

電話：(042) 223374

◆詳細資料歡迎函索◆