

收。

台南選2號加工番茄果實硬度高，在田間貯存期長，不易腐爛，可配合工廠原料調配，分2~3次採收。

病虫害防治

除注意一般番茄栽培的病虫害防治外，尤須注意以下的幾種。

白絹病：病株近地面的根莖部有水浸狀病斑，地上部逐漸萎凋，後病斑呈褐色，並發生很多的白色菌核。

防治：1.採行輪作。2.有機肥不宜施用過多。3.早期栽培應提早噴用50%大克爛（Dicloran）可濕性粉劑3,000倍液防治。

晚疫病：發病初期，在葉上形成小型不規則綠灰色的病斑，以後逐漸擴大，顏色變為暗褐而枯死或軟倒。

一般而言，台灣最易感染的季節是1~2月間，尤其氣溫在20°C左右。

防治：1.宜定期（7~10天）噴75%四氯異苯腈可濕性粉劑，發生嚴重則3~5天噴1次。2.氮肥勿

施過量。3.注意通風及充足的光照。

毒素病：病株的頂梢葉片不展開，退色而且有黃綠相間的嵌紋。植株萎縮不結果。

防治：1.迅速除去病株，並徹底防治蚜虫。2.種子消毒，用3~10%的第三磷酸鈉浸20分鐘。再用水清洗並曬乾。

線虫：罹病株有矮化的現象，下部葉片變黃，果實變小，結果少，根部造成瘤塊。有時可以併發白絹病或各種毒素病。

防治：1.注意前作物種類，如在番茄、胡瓜、胡蘿蔔及豆類等的後作，要注意前作物有無發生，若罹患過此病，不宜栽植。

2.發生嚴重時與禾本科作物輪作2~3年。

栽植前開溝（15公分）施用10%芬滅松粒劑，每公頃用量為30公斤。

番茄實蛾：初齡幼虫鑽入番茄苗或葉柄內，果實被害最多，莖葉次之。被害果實外觀有明顯的虫孔，並排出黑褐色圓形虫糞，最後導致果實腐爛。


防治：用90%納乃得粉劑2,000倍或20%芬化利可濕性粉劑5,000倍，每7~10天噴洒1次。為害嚴重時，可以將二者混合使用。

金寶螺（福壽螺）危害猖獗！！

請農友們速用：（原裝進口貨）

※徵求人才：
本公司急徵
推廣技術員，
農專畢可
待遇從優，
來函應徵。

滅蝸牛



餌劑

趕快來除害，避免受災禍！

使用方法：

將本劑研磨成粉末或直接撒布於田間（水位需保持2公分以下二天）或菜園溝內則可達到全面殺淨效果（每分地用藥量700~800公克）

製造商：日本第一農藥株式會社

進口商：都勝貿易有限公司（原為達勝貿易公司）

台北市大馬路20號電話：(02)5431663-5431664