

子不要生得多，生多了教不好。就只生兩個，好好照顧，盡量栽培他們。兒女都是愛父母的，只要愛他們，兒子、女兒都一樣會孝順的。」

大家聽了，笑着說：「阿風嫂，妳真聰明。20幾年前就知道實行家庭計畫，所以才養出2個好女兒來。」

阿風嫂說：「我今年才50歲，阿美阿英以後有了孩子，我還替她們帶得動。如果我孩子生得多的話，現在還正在吃苦哪！」

含飴弄孫

果然，1年以後，阿美生了一個白白嫩嫩的女娃娃，阿風嫂樂歪了嘴，抱回來帶，整天人前人後的誇外孫女可愛。

村人們羨慕阿風嫂一家人的和和樂樂，也覺悟到：「只要好好教，兒子、女兒一樣好。」



幸福家庭（張瑞卿）

農業繁殖栽培業者的好消息！！

●新植物活性劑——維他命的新應用

速大多[®]
START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效！！

使用1,000倍液・用量省 效果大

精美彩色說明書備索

日本UNIMAC SYSTEMS製造

◎培養優良苗木之插穗發根促進劑

愛根生液劑
OXYBERON オキシベロン

新開發液劑

使用方便、省時、省工、效果確實

日本 塩野義製藥株式会社 製造

台灣 塩野義製藥股份有限公司 進口

台灣區 台和園藝企業股份有限公司 總經銷

台北市士林區中正路104巷1弄2號

TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥: 101360

親愛的農友兄弟：
您們所栽培瓜果、蔬菜、園藝、花卉、水稻育苗、茶葉、菸草等農作物，如遇有各種生理與土壤所引起疑難不解之症狀時或是要提高產量及改良品質，請通知敝公司為您提供服務。


一、施肥設計（合理的施肥避免過量所引起的病害及浪費）
二、土壤分析（如何恢復地力及連作所產生敗壞問題）
三、植物營養（要素不平衡所引起生理病變）
以上作物生長畸形及隔年結果診斷防治，歡迎農業界專家提携指導，協助克服台灣土壤危機。

大益農有機股份有限公司 技術服務部

大甲鎮中山路一段郵巷8號

服務專線：(04) 八七三三九・八八二一八九

(0) 七〇二四五二



結球白菜 夏季栽培

問 我想在5月份栽培「亞端一號」結球白菜。請問：

(1)如何在育苗期防治立枯病、夜盜虫及菜心螟等病虫害。以上病虫害用藥皆不同，是否可以混合1次施用？

(2)定植後應隔多少時間做夜盜虫、小菜蛾、菜心螟的防治？

(3)生育中後期易發生的露菌病及軟腐病，應如何防治？

(4)夏季採圓畦式栽培，畦面覆蓋草蓆專用的塑膠布是否合經濟原則？（台中縣霧峰鄉菜園路10號湯碧修）

答 (1)於幼苗間拔後，本葉1~2片時，噴布25%「依得利」乳劑稀釋1,000倍與50%「甲基巴拉松」稀釋500倍的混合液1次，以防治苗立枯病、菜心螟及夜盜虫。

(2)定植後3、7、14、21及28天，輪流噴布下列任何1種藥劑防治菜心螟、夜盜虫及小菜蛾。①50%

（張瑞卿 攝）



「撲滅松」乳劑稀釋1,000倍。②50%「南風靈」乳劑稀釋1,000倍。③「大寶」稀釋1,000~1,500倍。④43%「施力松」乳劑稀釋1,000倍。


(3)露菌病可用35%「滅達樂」可濕性粉劑500倍液或是58%「鋅鋁滅達樂」可濕性粉劑稀釋400倍來防治。在採收前7~10天，應停止噴布農藥。

軟腐病到目前並沒有特殊有效的藥劑可以防治，只能避免種在前作是十字花科蔬菜的田地，或是用水田後地來種；另一面應選排水良好的田地，避免積水也可減少軟腐病的發生。

(4)根據試驗，在夏天若用黑色的塑膠布覆蓋結球白菜畦面，地溫升高3~5°C，植株不生長。若用銀白色的塑膠布覆蓋則發育正常，但結果並不比覆蓋稻草的好。所以與其花費2,000元塑膠布覆蓋畦面，不如用稻草較為經濟有效。（賴森雄）。

蓮霧樹勢恢復

問 我栽培蓮霧，為了促進提早開花，曾於催花前，做了必要的處理，即予以斷根及浸水。雖然



（廖敏卿 攝）

早花是催出了，但是部分的樹勢却因過於衰弱，而變成光長花芽而無葉芽。甚至經過了4個月，一再施肥及灌水，仍然生長停頓，依舊衰弱。請問應如何回復樹勢？（屏東縣林邊鄉仁和村仁愛路118號林和平）

答 此時宜徹底行疏花，避免養分過分消耗。並於花催出時，行間中耕，使土壤疏鬆，氧氣充足，加速於浸水期間腐敗的根誘發新根。常灌水，並多施氮肥，加速恢復樹勢。（王德男）

羊飼料

問 (1)做豆漿、豆腐剩下的豆渣有無營養價值？用來養羊適合否？