

天)，約隔20天左右灌溉一次。蒜球肥大末期至成熟期（種植後120天以後），應停止灌水。

附表一 每10公畝（1分地）大蒜施肥實例

除蘗摘苔

生長期中如發現分蘗的植株，應在株高約10公分時，及早除去莖葉較細的分蘗株，以維護主株生長。除蘗方法為手壓住主株，再拔除分蘗。

生育後期如有抽苔的植株，也應除去花苔，以免因花苔發育，消耗養分，影响蒜球肥大。摘去的蒜苔可供食用，清香嫩脆。

肥料名稱	全量 (公斤)	基肥用量 (公斤)	追肥用量			
			第一次 植後30天	第二次 植後50天	第三次 植後70天	第四次 植後90天
堆厩肥	1,500	1,500	--	--	--	--
硫酸銨	5-10	5-10	--	--	--	--
過磷酸鈣	50-60	50-60	--	--	--	--
氯化鉀	10-25	10-15	--	10	--	--
尿素	55-70	--	15	20	20	15

註：視土壤肥力和用途酌量增減。

附表二 大蒜田殺草劑使用實例（每公頃／每次）

藥劑名稱	用量	稀釋倍數	施藥方法及時期
65%雷蒙得可濕性粉劑	10.0	200	大蒜種植後將藥劑均勻噴射於圃地全面。
75%大克草可濕性粉劑	10.0	200	大蒜種植後將藥劑均勻噴射於圃地全面。
80%禾盾那可濕性粉劑	2.0	500	大蒜種植後將藥劑均勻噴射於圃地全面。
23.5%割地草乳劑	1.0	800	大蒜種植後將藥劑均勻噴射於圃地全面。


註：粉劑用量單位為公斤，乳劑為公升。

金寶螺（福壽螺）危害猖獗！！

請農友們速用：（原裝進口貨）

※徵求人才：
本公司急徵
推廣技術員，
農專畢可
待遇從優，
來函應徵。

滅蝸牛



餌劑

趕快來除害，避免受災禍！

使用方法：

將本劑研磨成粉末或直接撒布於田間（水位需保持2公分以下二天）
或菜園溝內則可達到全面殺淨效果（每分地用藥量700~800公克）

製造廠：日本第一農藥株式會社

進口商：郁勝貿易有限公司（原為連勝貿易公司）

台北市太原路20號電話：(02) 5510669 · 5519679