

害，成虫在果梗旁產卵，幼虫孵化後蛀入果實內部為害種子及蒂部，使果實提早脫落，造成嚴重落果，而未落果實亦常見幼虫及虫糞，降低商品價值。

防治果實蛀虫，應於花落後25日起以50%芬殺松乳劑或50%撲滅松乳劑1,000倍施藥，每隔10日1次，連續4~5次，於收穫前10日停止使用。

適度整枝修剪

龍眼一般均少整枝修剪，往往樹形高大，使管理、噴藥、採收均不易進行。

近年來人工昂貴，採收成本相當高，為降低管理、採收等成本，應從幼苗期即加以適度整枝修剪，使分枝點下降，鋸除向上枝條，矮化樹形，以免將來管理、採收不便。

成熟才可採收

龍眼果實之發育，在後期較為迅速，尤其可食之果肉部份，在開花後第7周才開始發育，至後期迅速增加。抽度之增加，亦以後期較速。然而，早期採收者價格較高，且有些品種成熟後甜度迅速減退，所以農家往往提早採收以應市。此時果實尚未成熟，果肉

亦未發育完全，無法發揮其品種特性，且早採果與完全成熟之果重有時相差達1~2成，無形中造成總產量之減少。

因此，龍眼果實須待完全成熟才可採收。因一般品種成熟後期甜度易減退，過晚採收亦不適合。目前經選出之優良品種，如楊桃葉、昭安寮、緞繭種、龍目種及10月龍眼等，甜味高且成熟後甜味減退較慢，尤其10月龍眼可在樹上保留近1個月而甜味不稍減，可稍晚採收。

加強推廣研究

鑑於本省龍眼栽培面積逐漸增加，且價格亦趨高，今後龍眼栽培應擺脫過去放任不加管理之觀念，走向企業化，並以正常施肥、灌溉、噴藥等方式去管理，才能生產優良果實。

今後龍眼栽培有待克服及研究的問題為

- (1)優良品種之選育及推廣。
- (2)隔年結果之研究及克服。
- (3)樹形矮化控制之方法。
- (4)新產品加工利用之開發。

有待研究試驗機關加以探討解決。

專業栽培蔬菜



豐年社最新出版——
“專業栽培蔬菜30種”

增訂第四版，介紹常吃蔬菜栽培法及
蔬菜無土栽培技術，增附彩色圖鑑170
餘幅，為蔬菜栽培的最好參考書。定價

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 豐年社
電話：(02) 3938148