投飼量：吃人魚嗜食肉類，尤其是活餌。利用野生吳郭魚，體長5～10公分，和吃人魚放在一起，不能過密。每次放養吳郭魚量，相等於吃人魚總放養重量即可。經常保持水中有魚，使吃人魚的食物不中斷，也可保持水質的澄清不惡。

經解剖檢查1尾重 100公克的食人魚，每次食量爲2～3公克，消化的時間爲6～8小時。因此吃人魚如以投餌專養的方法，每日可投飼2次，每次投與魚體總重3％，每隔5小時投放1次。但1天的投飼量，不得超過放養總重6％。

換水：普通半個月換1次水，1個月清1次底。換水時利用直徑 1.7～2公分的塑膠管，伸入水箱中，管口包以網目 0.5～1公分的網，用虹吸管原理將濁水吸出。並同時攪動底面砂石，使沉積於砂石表面的沉積物，溶解水中吸出。

水箱中的水吸去80％，停止吸出，同時徐徐注入清水，但不可直接注入自來水。自來水至少要打氣4小時以上，或將要利用的自來水，置於陽光下晒2小時以上，才可利用。

清理箱底砂石時，事先要把吃人魚撈出，放在其他的容器中，等清洗完了注水，再放回箱中。熱帶魚對水溫的變化非常敏感，，冬天換水時，注入的新水水溫，不能低於原水溫（加溫中）攝氏2度以上。

如無相等溫的水，可以慢慢注入較原水溫低的水，使原水溫慢慢降低，魚兒也慢慢地適應緩慢變低的水溫，不致死亡。

好設備好收穫

吃人魚體型如赤鯨。肉味鮮美細嫩，不亞於赤鯨或黑鯛魚（烏鱲）大量繁養殖，將帶給人們另一種新鮮美味，又可增加漁民收入。

若要在台灣河川溪流中，養殖吃人魚魚苗，讓牠繁殖生長，將給人們帶來無比的威脅。因此將來應作單性養殖，或利用甲基睪丸素雄性荷爾蒙，使雌魚全部轉變雄性，不能行交配。

吃人魚養殖在大池中，其體型比在水族箱中更大。養成時間相對縮短。普通養至4尾1台斤約6～7個月，即可達上市體型。如投飼充足，生長更快。

利用濱海地區，鑿井養殖吃人魚，並繁殖野生吳郭魚或其他雜魚蝦，如伍鬚蝦、蝦虎、大肚魚等供給吃人魚食用，不但可減低養魚成本，且不怕魚苗流入河川。

三 SANKYO 共

日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30％液劑



培育健苗必備良藥

徹底消滅土壤病菌

立枯靈的特長

1.能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2.能促進根群發育，防止根部老化。
3.能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4.能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5.能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6.無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

＊讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質＊

台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司
1952 8P
台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 寶昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414・7050155