



保 稻 安

保護您的稻作平安成長

本藥劑業經農林廳72年5月11日
72農植字第3501號通函緊急推廣在案

毒殺金寶螺
兼治稻熱病

請看
71年8月4日
聯合報

福壽螺為害農作
吃光一整池的菱

用保稻安毒殺很有效

據71年8月5日
中國時報記載

**金寶螺為害農作物
農試所提防治方法**

【駐東訊】金寶螺為害稻作及其他農作物素來嚴重，省農試所特提供防治方法，同時，省農林廳也通知縣農業

局，決定撥款補助縣在八百公頃的溝渠，根本道上施藥防治，以確保農作物的生長。該所另外也提供保稻安藥劑供為防治金寶螺之用。該藥不但對金寶螺有毒害之效，同時更可兼具有防治稻熱病的效果，每公頃使用藥量為五百三十公克即可，施藥後四、六小時見效。

【中興新村訊】省農試所昨在農試所邀請各縣市政府及各區農改場有關人員，商討福壽螺防治事宜。這次會議中，各縣

市政府人員報告，福壽螺已出現在各地，預計今年內將隨農田灌溉及排水系統散佈各地區農田、渠道、池塘。屏東縣政府代表報告說，福壽螺繁殖能力極強驚人，該縣林邊鄉有一處菱池，生稻安在福壽螺活動的長茂盛的菱，幾乎已被福壽螺吃光，菱池上的人為，淺以重，僅十名女工在池中摘取福壽螺，昨午，天

省農試所應用動物系研究發現，使用保稻安在福壽螺活動的稻田後，牠會停於中，在廿四小時至四十八小時內死亡，死後口殼微開，極易分離死。保稻安為多年前生產的防治稻熱病藥劑，後廉價的吉來藥劑應市，在價格上無法競爭而停產。農試所早推薦的另，一種殺螺劑是聚乙脞，施藥濃度仍為萬分之一，用藥後廿四小時死亡，死後口殼微閉，不易分離死。

◎誠徵北區(台北、桃園、新竹、苗栗)經銷商
請洽：金鈺園有限公司



台灣總代理：**德化股份有限公司**

台北市中山北路3段54號企業大樓2樓 電話：(02) 5960121~9

台灣總經理：**金鈺園有限公司**

台中市學士路87巷5號 電話：(042) 233195