

兔的疾病防治

— 李茂盛·黃瓊姿 —

以往本省養兔業不興旺，疾病流行造成死亡率很高，也是主要因素之一。兔的疾病種類雖不多，但因兔比較脆弱，得病後不易治療，管理上應預防重於治療。可惜一般飼養者常因疏忽，而遭受很大的損失，結果失却飼養興趣。

危害本省養兔業較普遍及易遭損失的疾病，有下列幾種：

一·下痢症：臨床上由下痢的形態，分普通性下痢、粘液性下痢和出血性下痢。病的過程很快，虛弱死亡也快，常在斃死後才發現有下痢症狀。

本症的治療相當困難，但如能在早期發現軟便症狀時，就以抗生素或磺胺劑，行靜脈或肌肉注射，再補充營養劑及體液，會有很好的療效。但粘液性下痢和出血性下痢的症狀較嚴重，至今仍無有效藥品，最好將病兔隔離或撲殺。如有耐過的兔，也不能留作種用。

二·球虫病：有腸型、肝型兩種。主要的危害是影响發育、生長，病兔逐漸消瘦虛弱、易感染其他疾病而致死亡。本病與下痢、鼓脹的發生有密切關係，如果驅虫完善，能減少下痢的病例。

驅虫方法為以磺胺加入水中或飼料中，一般雞用藥都可運用，劑量也差不多。由於兔的生長快速，更新也快，所以需2~3個月定期驅虫1次。

三·涕溢症：目前本省此症的感染率很高。由巴氏桿菌引起的上呼吸道感染，有鼻塞、流鼻涕及噴鼻的症狀。鼻鏡沾染污物，在氣候突變或環境因素驟變時，易轉變成肺炎而死亡。

一般會影響母兔繁殖能力及生長兔的育成，本省的受害情況已到很嚴重的地步。

以抗生素治療（在未轉變成肺炎之前）雖然有效，但易再發。最好能作細菌敏感度測定，利用最有效的藥品治療。病兔應淘汰出售，不作種用。

四·耳、腳癬：本症感染也很普遍，但常為人們所疏忽。病兔精神不安，影响食慾，逐漸消瘦。尤其患有腳癬者，因患肢狂癢而啃腳趾，血淋淋而發炎腫脹跛行。

頗具威脅的是本病有傳染性，污染本病後不易根絕，而且耳癬、腳癬能互為感染。

最簡易的治療方法，是以5~6公克100%牛豬

安，先以少許水溶解後，以沙拉油配至100cc，用滴油器盛裝，使用前搖盪使混合均勻。患兔每耳依症狀輕重滴1~3滴，太多時有中毒或刺激中耳發炎的缺點，但投藥方便具有特效。

牛豬安是強烈的外用藥，使用要小心。患肢可用5~6%牛豬安水溶液清洗（用油脂恐有被舔食而中毒的危險），如兔羣有腳、耳癬時，最好定期（約2星期）檢查1次。腳耳癬在感染初期即予治療，效果較佳。

五·踝關節炎：患部發生鱗狀痼塊，嚴重時可能出血或腫脹化膿而跛行。病兔食慾減退，逐漸消瘦。依病況淘汰出售，以減少損失，或墊以厚的褥草，患部排膿擦藥。易患這種病的體質可能遺傳，最好不要從有此血統的仔兔選留作種用。

六·其他疾病：有狼齒、乳房炎、子宮內膜炎、後驅麻痺、歪頸、粘液腫、尿灼傷等，間或會有發生，但病例不多。

一般說來，兔的疾病防治，除了定期做必要的措施外，要隨時觀察，注意兔子的發育生長情況。一見發病即予隔離治療，或淘汰出售。因為兔子飼養期很短，治療病兔，既花藥錢又花工夫，較不具經濟價值。除非是情形特殊，如繁殖能力良好的種兔，才有價值治療它。

病兔空出的籠子，必須徹底清洗消毒後，才可再度使用。經營上如能維持兔羣的健康，繁殖能力才會很好。



——兔欄墊褥草——