




黑葉種荔枝 產量穩定

問 我有一片荔枝園位於埔里，每年均辛若照顧，但血本無歸。所種荔枝是黑葉種，今決定嫁接糯米糍，不知是否可行？（南投縣仁愛鄉霧社仁和路18號黃正雄）

答 種荔枝而造成「血本無歸」與黑葉品種並無關係。黑葉是一世界性的荔枝優良品種，生產可靠，品質甚優，普受歡迎。

糯米糍品質固然較黑葉為優，但其他缺點甚多，所以迄未見普及。

將黑葉改接為糯米糍，可能有兩種後果，(1)生產不穩定，(2)嫁接的成活率不高。即使接活，由於風害等影響，可能遭遇嚴重損失。

如需嫁接，可商請嘉義縣竹崎鄉農會介紹嫁接龍眼有經驗的果農，荔枝嫁接方法與龍眼相同，重要的地方是決定嫁接時期與選取接穗的經驗，並無其他特殊處。

至於荔枝果園管理方法，可商請「嘉義農業試驗分所」派員指導。（張振岱）



預防豬腸扭轉 應減少緊迫

問 豬的黃疸和急性扭腸有無特效藥物治療，或有更好的處理方法？（台南縣北門鄉中樞100號鄭振邦）

答 (1)所謂黃疸，嚴格而言是一種症狀而非疾病，亦即它是由某種疾病所引起，例如是鉤端螺旋體菌感染或某種肝病，所以最好是請家畜疾病防治所或養豬科學研究所病理系找出真正的原因，再設法治療。不然，只有儘早淘汰。

(2)豬急性腸扭轉無特效藥治療，只可預防發生。預防的方法是減少緊迫，諸如管理要溫和，不可粗暴踢打追趕，不可餵太飽，不可關得太擁擠，防止打架、跳欄。

餓久了，開始放飼料時，往往在進口處的豬欄放飼料時，較裏面豬欄的豬等不及而叫喊騷動，甚至跳



欄。又原本不同欄的豬，合併一欄飼養時，一開始就會打架，凡此皆應避免。

除腸扭轉外尚有胃腸扭轉、胃脾扭轉等原因都一樣，預防方法也一樣。（張靖男）

木瓜種子—— 褐色的最成熟

問 (1)木瓜雌株、雄株及兩性株在多大時才可鑑別？可否用雄花蕊促使結果？

(2)成熟木瓜內種子有黑色、褐色兩種，宜採那一種種子？

(3)育苗或移植，有那種藥物可促進根苗發育？

(4)木瓜開出的花蕊，是在第幾葉腋間？摘除腋芽

磚廠挖土損壞隣地

應負責回復原狀

南投縣草屯鎮富寮里中正路 448 號
吳景坤先生問：

我有 1 筆山坡地，毗鄰一窯業磚廠。
。磚廠去年掘土做磚塊，深及數 10 丈，致使我的土地每遇雨天即漸崩落。現已崩落 1 分多地，日後還會再惡化。目前磚廠已停工，請問能否請求賠償？程序上如何處理？

高瑞鏗律師答覆：

依據民法第 774 條、184 條、213 條及 214 條的規定，土地所有人經營工業及行使其他的權利，應注意防免鄰地的損害，因故意或過失，不法侵害他人

權利者，負損害賠償責任。

負損害賠償責任者，應回復他方損害發生前的原狀。應回復原狀者，如經債權人定相當期限催告後，逾期不為回復時，債權人得請求以金錢賠償其損害。

你須先以郵局存證信函或法院認證信函限期催告對方，將已崩落的 1 分多土地回復原狀。如對方逾期不為履行，你可請人估計回復土方（並加護岸）所需費用，請求賠償。

如仍置之不理會，恐應提起訴訟，於獲致勝訴判決確定後，聲請強制執行。

的正確方法？為何腋芽摘除後，在原腋芽邊却開出花蕊？是否摘除腋芽方法不正確，而影响結果期？

(5) 木瓜果實何時可實施包紙？用什麼紙？會影響木瓜成熟度嗎？

(6) 風害以 0.5 % 尿素行葉面施肥，如背桶 16 公升容量，應用尿素若干？

(7) 木瓜長至 2 尺高時，葉心有 2、3 叢，是什麼原因？須否摘除？

(8) 木瓜採種，如果園內都沒有雄株該怎麼辦？

(9) 平時我施藥木瓜時，以 16 公升計「鋅鋤乃浦」400 倍、「免賴得」3,000 倍並混合尿素 50 公克、硼砂 400 倍每隔 10~14 日施藥 1 次？是否可以？有沒有必要？

(10) 木瓜採收的標準為何？（南投縣埔里鎮東華路 27 號陳耀宗）

答 (1) 內行者於花蒂如「豆粒」大時，即可由鑑別花（樹）型區分。可以雄花行人工授粉，促使着果。

(2) 同 1 個木瓜腔內的種子，成熟度不一致。種子成熟過程為白色→黑色→褐色。所以宜採成熟度高的褐色種子，丟棄未充分成熟的白色或黑色種子。

(3) 只要種子新鮮、充實，氣候土壤及肥培管理良好，木瓜育苗及移植甚為容易，無需利用生長素或發根劑。

(4) 木瓜開花所需的葉節數依品種、氣候、土壤及肥培管理而異，一般為 20~30 片葉的葉腋間始花。摘除腋芽宜選晴天，並從基部摘除，以免再萌芽及在腋

芽開花，競爭養、水分，影响主幹開花結果期。

(5) 木瓜果實長達 4~5 分熟時，為防冬季冷風吹襲，夏季植株倒斜，或葉片太少日晒或病虫害，可以牛皮紙、水泥袋紙或報紙包裹果實，影响成熟不大。


(6) 0.5% 尿素，如以 16 公升噴霧桶，應放 80 公克（約 2 台兩）尿素。

(7) 木瓜樹生長期間，生長點若受損傷即會產生分枝，宜將此分枝儘早摘除，選留 1 健枝。

(8) 木瓜採種時，絕不能採雄株花粉授粉，宜以兩性株自交或兩性株交雌採。

(9) 硼砂及尿素沒有必要每 10~14 天噴 1 次，應視實際需要情形而定。又「鋅鋤乃浦」及「免賴得」只要 1 種即可。

(10) 木瓜採收的成熟度依品種、季節及市場遠近而異。一般夏天只要 1~2 果溝微變黃即可採，冬季則需 4~5 果溝變黃，才可採。（王德男）



木瓜倒株栽培