

表2. 緩效性肥料處理後 6 星期，對非洲鳳仙花 Fewtasia White 品種生育的影響：

肥料種類	株高 公分	幅寬 公分	鮮重 公克/株	6 周內每株 已開花數
對照 奧妙肥 (14-14-14) 奧妙肥 (18-6-12) 魔肥 (7-40-6)	每周加施液肥 2 次			
	25.7	46	25.8	93.2
	24	40.5	194.5	76.2
	21	43.7	242.3	61.5
奧妙肥 (14-14-14) 奧妙肥 (18-6-12) 魔肥 (7-40-6)	不加施液肥			
	22	36	116.5	92
	19	34	78.2	98.5
	18.5	39	84.2	80

註 1：成苗於口徑 5×5 公分聯盆移出，3 月 16 日定植於 4 吋盆，到 4 月 27 日採收，幅寬由 5 公分增至 34~46 公分，可見生長十分快速。

註 2：培養土中每公升拌入 2.5 公克過磷酸石灰及 2.5 公克苦土石灰。

施用追肥

非洲鳳仙花在快速生長期，每周施用 2 次液肥已足，拌入緩效性肥料，可減少液肥施用次數。若只拌緩效性肥料，不再追施液肥，雖開花多，1 個月後，葉片漸黃，品質受損，所以宜加施液肥，每周施肥 1 次即可。追肥配方有 2 種：

1. 高成分可溶性肥料的應用：以 Petecs (20-20-20) 高成分肥料 1 公克/公升水。在小苗期每周施肥 2 次，濃度減半，成株定植於盆，未施緩效肥料的，每周施液肥 2 次，若已拌入緩效性肥料，則每周施肥 1 次即可。

2. 硝酸鉀與尿素：取硝酸鉀 56 公克及尿素 30 公克溶成 1 公升水溶液，每次用時稀釋 100 倍。已拌入緩效性肥料，每周施液肥 1 次即可。

若不用緩效性肥料，無土介質中，每公升介質先拌入過磷酸石灰 2.5 公克及苦土石灰 2.5 公克，以後施液肥每周 2 次，Petecs 與硝酸鉀及尿素二種肥料交互施用效果最好，拌入緩效性 Oswocote 肥料後較好管理。



彩色 實用食譜大贈送

訂掃描綫雜誌一年(12期) 650元

贈送：中視叢書「實用食譜」

或「鳳情千千萬」錄音帶

或「鄭少秋專輯」錄音帶

或「我是中國人」錄音帶

郵政劃撥一五四五〇帳號·中視出版部
電話：七四一—〇七五九·七一—〇三一—