



栽培高床(中間塑膠管為噴灌設施)

早晨澆水，病害較少發生。

扦插苗栽植2個月後，即可開始切花。切花採收，是以頭狀花序中第二~三輪管狀花開花時(可以看到雄蕊)，由花莖基部摘採。這時期的花朵也就是非洲菊最漂亮的時期。

病蟲害防治

和一般作物一樣，為害非洲菊的蟲害(包括非昆蟲類的動物)有蚜蟲、毛蟲(小菜蛾幼蟲)紅蜘蛛、介殼蟲、銹壁蝨、蝸牛等。應該定期噴藥防治。至於病害較為嚴重，現將其中主要病害略述於下：

疫病：高溫多雨或澆水過多，由土壤中病原卵孢子寄生所引起，為害根莖及根部。發病時將被害植株挖除燒燬，病株附近灌注銅水和劑400~700倍，或鏈黴素500~1,500倍液。最根本的防治方法，是栽植前土壤徹底消毒，並以乾淨的水灌溉。

根腐病：高溫多濕時發病較多。初期植株發育不良，在高溫中午時刻葉片萎凋。罹病植株不易枯死，但日益衰弱而死，被害植株根部腐爛，將根縱剖，可看到中心柱已變色。土壤消毒、選擇健康植株、培養土排水良好，是最有效的防治方法。

葉斑病：發生於葉片上，初期葉面出現紫色，病斑呈同心圓擴大，嚴重時病葉枯死。使用鋅乃浦、錳乃浦500倍液，噴灑葉片表面與背面即可防治。

白粉病：大多發生於秋末初冬，天氣轉涼但空氣潮濕，有霧或有露水的季節。發病時葉片有白粉斑點，漸擴大至整葉葉片黃化，植株衰弱不開花。發病時可噴灑萬力1,000倍預防，也可以以可利生精或可溶性硫防治。

大花種非洲菊栽培容易，管理方便，而且單位面積產量高。平均每坪每年可切花750枝，是極有潛力的切花作物。

IHARA

ダコニール[®]

庵原達克靈[®]

可濕性粉劑

- | | | |
|---------------|---|------------|
| ● 洋蔥・紫斑病(腐敗病) | → | ● 胡瓜・白粉病 |
| ● 洋蔥・露菌病 | → | ● 胡瓜・炭疽病 |
| ● 鬱金香・褐斑病 | → | ● 胡瓜・黑星病 |
| ● 柑桔・摘痂病 | → | ● 蕃茄・葉霉病 |
| ● 蕃茄・疫病 | → | ● 蕃茄・輪紋病 |
| ● 西瓜・炭疽病 | → | ● 桃・黑星病 |
| ● 蘋果・斑點落葉病 | → | ● 桃・灰星病 |
| ● 白菜・黑斑病 | → | ● 茶・餅病、炭疽病 |
| ● 馬鈴薯・疫病 | → | ● 茶・網眼病 |
| ● 胡瓜・露菌病 | → | ● 梅・黑星病 |

蔬菜病害

之
克星

果樹病害

之
救星



台灣庵原農藥股份有限公司

台北市南京東路2段97號10樓
TEL: (02) 5818156~8