

香菇栽培用遮光網 密度60~80%為宜

問 香菇段木栽培用的遮光網，密度多少較適當？
(南投魚池鄉五城村五城巷89之7號徐錦漢)

答 香菇種植時光線應在3~8%，且通風及排水良好，因此菇棚左右兩側，可用密度為60~80%的遮光網，而上部可用以上的遮光網，重疊覆蓋。
(廖英明)

預防美濃瓜裂果 注意品種及灌排水

問 美濃瓜為何只有七分熟就開始有裂痕，如何防治？
(雲林二崙鄉來惠村紹安路20號廖年仁)

答 防治方法為：
(1)選擇較不易裂果品種如農友二號、新玉等。
(2)注意田間灌排水：除雨季須作好排水工作外，在結果期田間水分應保持一定，不可劇乾劇濕。尤其水田糊仔栽培土壤較粘重，對水分更為敏感，應於畦溝永遠保持 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{1}{2}$ 的溝水。(黃賢良)



潮濕地區 可飼養水牛

問 (1)飼養水牛須那些設備？1次宜飼養多少頭？
(2)水牛與肉牛售價相差多少？
(3)那些地區適宜飼養？
(4)每頭所須牛欄面積若干？
(5)每頭所須牧地面積若干？(雲林縣虎尾鎮三合里吳厝36號鍾榮河)

答 (1)如有自然草原，放牧養水牛，設備只限於牛欄及電牧器。以飼養50頭的經營規模較經濟合算。目前中央加速計畫有辦理種母牛貸款，可向當地農會及縣政府洽詢。

(2)如為同體重及狀況的水牛與肉牛，活體重每公斤售價差10~15元，主要原因是水牛的屠宰率較低。

(3)目前政府推廣水牛地區，主要是在東北部潮濕地區、菅草地區、河床地、大面積荒地。黃牛則是在



中南部較乾的地方，牧草品質較佳的草地上飼養。

最近在台北縣五股鄉推廣，50頭母牛利用廢耕地的草料，及電牧器管理放牧牛羣，可前往觀摩。

(4)每頭牛以1坪計算，如有樹蔭不需要牛棚。

(5)每頭牛需要0.5~1公頃的草地，需充分供應草料，如果外買粗料或精飼料，成本會太高，失去競爭能力。(程中江)

養蜆 須有好水源

問 我有水田1公頃，大半為沙土質地，想改成養蜆池，請問：

(1)放養水池該有何種設備？池深多少為宜？池底該填何種沙？需多厚？

(2)養蜆以什麼做餌料最好？

(3)我現養有數10頭羊，若以飼料袋裝羊糞，放進

水肥池發酵，再放肥水進養殖池是否可以？

(3)若以羊糞養蜆，那羊又該以什麼為飼料？目前我是以青草為主食，豆腐渣、米糠及麥麸為副食？

(5)放養密度如何？

(6)聽說養蜆常會有含土、黑粒或死殼的現象發生，這是什麼原因？該如何防治？（彰化縣芳苑鄉新生村新復路10號陳欲）

答

(1)養蜆以沙粒質為佳，水深保持在 1~1.2公尺左右。不必特殊設備，但必須有好的水源，如放養密度高，可安裝水車較保險。水池再行填加沙土是可以的，但成本高，以填加沙粒狀為佳，厚度半尺以上較佳。

(2)蜆是以水中有機物質為飼料，尤以植物性浮游生物為最佳，如矽藻、鞭毛藻、綠藻等。其他有機碎片也可攝食。

(3)羊主要為吃草，草糞便纖維質較多，發酵後肥分較低，但一樣可做為肥料。


(4)可增加豆腐渣、米糠、麥麸飼料量，其糞便肥分可提高。

(5)每坪可放養蜆苗 0.5~1 公斤。

(6)蜆含土，可能是底質不良或死蜆含泥所致。

死殼多，是養殖不得法，而引起泛池、死亡，或其他環境不良所致，注意水質及成長管理，密度不要太高。

黑粒是指什麼不清楚，是否指臭頭呢？如是臭頭，由於營養不良所引起的，可用豆餅、米糠、麵粉粕、雞糞、水肥或台肥15號追肥。但不要太多。（丁雲源）



採捕成蜆
精選大型者出售（陳益裕）

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

有機質 磷鉀肥
魚精 開花肥
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大
美國ALASKA魚肥公司 出品

◆詳細資料歡迎函索◆

果樹·蔬菜用 **花寶 (HYPONeX) 系列!!**

花寶二號
20-20-20

花寶三號
10-30-20

促進果實肥大 糖度增加 促進開花 增加着果率 結實良好
美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》
——改善水果品質的秘方——
促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
カルゲン
日本ネオゲン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經銷

台和園藝企業股份有限公司
Taiwan Horticultural Co., Ltd.
台北市士林區中正路 104 巷 1 弄 2 號
台中連絡處：台中市三民路一段 164 號

郵政劃撥：101360
電話：(02) 831-3302
電話：(042) 223374