




## 大西番果 經濟價值低

**問** 最近報載嘉義縣番路鄉農友們，目前在大量栽植一種「大西番果」。請問：

- (1)大西番果對於氣候（即氣溫）有選擇否？
- (2)那一種土質最適合栽培？
- (3)將來市場如何？
- (4)栽培多久可結果？

(5)栽培管理要點為何？（屏東縣潮州鎮三星里朝昇東路42巷7號方榮煌）

**答** (1)大西番果是純熱帶性多年生木質藤本。需要高溫和空氣高濕度，台灣夏、秋氣候尚屬適宜，冬春氣候對結果不利。因此每年開花結果時期較熱帶為短，果實產量不能和熱帶相比。

(2)大西番果對土質無甚選擇，但不耐乾燥和積水，最好是排水良好的沙壤土。

(3)大西番果遠在日據時期即曾引進種植，因不具特殊價值，無市場可言。

(4)播種苗約9個月就可開始開花結果，種植後的第2年可有正常生產。

(5)栽培需注意下列幾點：①株行距約7公尺，②



需備水平式棚架（同絲瓜棚），③多用有機肥料，④因同花不受粉，在幼蔓未混交以前，有時需要人工授粉，結果比較可靠。⑤大西番果有大果與小果兩品種，小果品種結果較易，但品質較差，大果品種結果較難，品質較優。（張振宙）

## 殘羹餵豬 應注意來源

**問** (1)母猪以殘飯來餵食，有些塑膠袋未撿乾淨，而母猪食後積於肚內，是否會引起腰子腫大而發黑呢？此病是否會相互傳染？

(2)是否越肥的母猪，生產時越容易引發乳房炎？

(3)母猪受孕後至3個月期間，為控制體重而予以嚴格的限食，對日後生產的乳豬有無影響？（嘉義縣朴子鎮天星新村82號林國彰）



**答** (1)以殘飯餵豬最重要的先要注意來源，如果是來自疫區（正在發或潛在有某病），很容易將疾病帶入自己的豬羣。

確認來源可靠後，要注意須盡早使用。使用前，務必再煮過一遍，否則在運輸至餵前的一大段時間內，已有很多微生物滋長繁殖，有害豬的健康，若放置太久，煮亦無益。因此收取殘飯，務必新鮮，且餵前須再煮過。

塑膠袋本身不會分解，母猪食後不會引起腰子腫大發黑。因塑膠袋而致死的原因是吃了過多，既無法消化又無法排出，終於引起腸阻塞而死。此非微生物性疾病，所以不會互相傳染，防護之道，只有在餵前，徹底撿除塑膠袋。

(2)「越肥的母猪生產時越容易引發乳房炎」這個觀念是錯的。倒是母猪在即將斷奶時，乳汁仍然分泌