

花卉生產



美化庭園的錦葵科植物

楊紹溥

錦葵科植物包括有草本、灌木、喬木，有40屬900多種，原產於熱帶及溫帶，其中的木槿屬、棉屬、賽葵屬、野棉花屬、韶子屬，乃為重要的屬。而木槿屬的植物，在今日世界早已超過200種類之多，並且木槿、朱槿、木芙蓉等的栽培，都是樹姿美觀，開花艷麗，受到大眾所喜愛。並在花卉園藝的應用栽培上，佔着非常重要的位置。

樹姿極美觀

錦葵科植物的葉為互生、單葉，全緣或具有不同程度的分裂，葉脈常為掌狀具有托葉，花一般為兩性，整齊且大而艷麗，單生或排列成穗狀、總狀而成圓錐花序。花萼5裂，且常有上花萼存在，花瓣5片、大型、雄蕊多數，花絲互相結合成筒狀，將雌蕊包裹在筒內，只露出柱頭，果實為蒴果或離果。

錦葵科植物在園藝方面佔有舉足輕重的地位，各式各樣的朱槿、芙蓉等都是它的成員，千嬌百媚，惹人憐愛。

主要的五種

現在介紹的主要錦葵科植物，有木槿、朱槿、南美朱槿、裂瓣朱槿、木芙蓉等，藉以提供給愛好者栽培時參考。

一・木槿

學名：*Hibiscus syriacus* Linn.

英名：Rose of sharon.



別稱：喇叭花（福建）、櫛樹（江蘇）、朝開暮落花（本草綱目）。

性狀：木槿是落葉灌木，高可達3~4公尺，原產小亞細亞，分布我國大陸及日本，台灣早在1,661年由華南引入栽培。樹幹灰白色、分枝多、葉卵形、3淺裂，葉緣有鋸齒。每年1月落葉，2月開始萌發新葉，開花期5~10月，花徑5~6公分。

因品種的不同，花有單瓣、重瓣之分，花色有白、紫以及桃紅等色的變化，花朵在夜間呈半開狀態，翌晨再全開，耐寒性較強，但並不耐乾旱，喜好適度的濕潤壤土，陽性樹，日照需充足，否則生育以及開花皆不良好。

繁殖：木槿可用扦插法繁殖，也可以播種法繁殖，扦插繁殖的適期為4~5月間，插穗長度若有15公分，當年即可開花。若以種子繁殖，則於秋季採收種子，翌年春季播種，需要2~3年後才能開花，成苗可於2月間施堆肥或完全發酵的豆餅液，6月可施磷鉀複合肥，以促使開花華美。

木槿是本省典型的夏季木本花卉，除用作公園、



木 槿

庭園的添景樹外，並可栽植成綠籬，但必需要注意的是，如用作綠籬，幼苗時需反覆行摘心技術，以促使多生下枝，而整枝工作，則在冬季落葉期間實施。

二・朱槿

學名：*Hibiscus rosa-sinensis* Linn.

英名：Rose Mallow; Chinese hibisbus.

別稱：佛桑（南越筆記），赤槿（南方草木狀）。

性狀：朱槿為常綠灌木，高2~3公尺，原產我國大陸、印度、馬來西亞等地，於16世紀由華南引入台灣各地普遍栽培。小枝紫紅色，分枝多，葉呈廣卵形，3~7裂，濃綠色有光澤，上半葉緣有粗鋸齒，葉柄紫紅色，低溫期常變成紅色葉，別有一番景緻，花期甚長，幾乎終年開花，所以有四季花的稱謂。

盛花期5~10月，花朶腋生、單一，花色因品種不同，而有絢紅、紅、橙黃、粉紅、混合等色，變化萬千，十分好看。花型也有單瓣、重瓣之分。

不過同上述木槿相比，朱槿較不耐寒，而宜栽植於溫暖地帶，對土壤選擇不苛，凡排水良好之地，任何土壤均可種植，但在陽光充足，富有機質的土壤處，其生長及開花更加旺盛美麗。

繁殖：繁殖是以扦插為主，每年春末夏初之際，剪取組織充實枝條15~20公分為一段，插於濕潤土壤

中，生根容易成活率高。施肥以腐熟堆肥、天然肥或三要素均可，每3個月施用1次。成株開花後，每半年施用1次即可。

朱槿是台灣大眾化的熱帶花木，可用作公園、綠地的美化，因其植株萌芽力強，生長快、而耐修剪，非常適合栽植為綠籬，每年需修剪1~2次，剪除多餘小枝或上部枝條，以促使下部枝條繁茂，造成良好綠籬效果。

三・南美朱槿

學名：*Malvaviscus arboreus* Cav.

英名：South American wax Mallow,
Sleeping Hibiscus

別稱：懸鈴花、捲瓣朱槿、燈籠扶桑。

性狀：南美朱槿原產於墨西哥、秘魯、巴西等地，於1910年始引入台灣普通栽培，為常綠傾斜性灌木，高可2~4公尺，基灰白色，分枝多而密集，葉卵形、先端尖、基部心形，葉緣具有不規則的鋸齒。

全年開花，但到盛夏時較少，花色鮮紅，花瓣呈螺旋狀向右旋捲而不張開，別緻美觀，所以很多人會誤認為是含苞待放的花。樹性強健，能耐乾旱，對土壤不甚選擇，只要日照充足、排水良好之處，均能生長。



南美朱槿

繁殖：繁殖法以扦插為主，在春、秋兩季實施最為適宜。扦插是剪取去年生枝每10公分為一段，除去大葉片，插入土中 $\frac{1}{2}$ ，保持濕潤，並稍加遮蓋。兩周後即可發根，施肥方法與朱槿同。南美朱槿，是一種花姿奇特的熱帶花木，除用作公園、綠地美化及綠籬外，並可間植行道樹間，以增道路的美觀。

四・裂瓣朱槿

學名：*Hibiscus Shizopetalus* (Mast.)
Hook. f.

英名：Fringed hibiscus

別稱：風鈴扶桑。

性狀：裂瓣朱槿為常綠灌木，高3~5公尺，東非的原產植物，於19世紀引入台灣，全省各地栽培普遍，尤以中部為多。小枝綠色，葉卵狀橢圓形，有鋸齒，較朱槿側枝少而主幹伸長，開花期在3~12月間，僅低溫季不見花。花梗細長，懸垂狀，花瓣5深裂而反捲，淺紅色，雄蕊伸出花冠，花狀似風鈴，迎風搖曳，多彩多姿，甚是美觀。

繁殖：本植物的栽培，耐寒性較差，能耐乾旱，對土壤選擇不苛，但以排水良好且富含有機質的壤土



裂瓣朱槿



不芙蓉

最適合生長，其繁殖、施肥、及美化用途均同上述南美朱槿。

五・木芙蓉

學名：*Hibiscus Mutabilis* Linn.

英名：Cottonrose bibiscus.

別稱：芙蓉花（湖南、四川），華木（陝西），山芙蓉（台灣），地芙蓉（圖經本草），四面花，轉觀花（群芳譜）。

性狀：木芙蓉原產我國大陸、日本暖地，台灣有自生及栽培，枝及葉背密被白色星狀毛，葉掌狀3~7淺裂，齒牙緣，每年9~10月開花，花徑10公分許，花5瓣，因品種不同而有單、重瓣之別，花色可自白變為紅色，同時可着生純白色，所以名曰醉芙蓉，極為美艷。

繁殖：繁殖可以扦插、播種、分株諸法行之，但通常多以扦插法繁殖，性喜濕潤的稍黏質壤土，耐寒力較強，基肥可多施堆肥，成苗於6~7月施磷鉀複合肥，可促使開花華美。木芙蓉可用作公園、庭園佈置，其配植乃以單植或大小數株，配合群植，均能顯示其美。