

答 (1)「花芽分化」需同時具備下面兩個條件，①枝葉成熟，不抽新梢，②「碳氮比」高。

你的蓮霧雖一直控制未抽梢，但可能枝葉內「碳氮比」不高，不易分化花芽，致催花後開花少。

催花所使用的「速滅松」濃度不夠，或「萘乙酸鈉」濃度太高，使落葉少或不夠。或「速滅松」濃度太高，燒傷芽眼，造成催花後都未抽新梢，即使已花芽分化，也不易萌發。

(2)第2次催花後，開花少的原因同(1)。

枝條上有青苔是綠藻寄生，與催花成功與否並無關係。

斷根雖為蓮霧催花前，控制抽梢，促進提早花芽分化的方法，但非最好、最有效的方法。連續浸水法最有效。斷根成功與否，受氣候、樹勢、土質及斷根時期、程度……等影响。

此時已屆冬季，大多已分化花芽，可再催花，但催花劑中不可加入「萘乙酸鈉」。


(3)催花後兩周，剛開始萌芽時，不宜即噴殺虫劑。因此時芽體組織極脆弱，容易發生藥害，而使幼花蕾乾枯，宜再待1~2周後，才噴殺虫劑且濃度不可太高。(王德男)

雜交種玉米 不可自行留種

問 我種了8分地的超甜玉米—236，又大又粗，但因現在市場價差，我想留種，以備下期再種。是否可行？(屏東縣枋寮鄉天時村中華路476號陸崇源)

答 超甜玉米品種236是美國進口雜交種，不可留作種子用。

雜交種是利用作物因子第1代優勢，育成的新品種。如果將它留作種子，在第2代以後播種時，優勢因子變劣，發育生長不齊，結實成果參差不一，影响產量甚大，所以不可留作種子用。(呂阿牛)



掃丹[®] 乳劑 粒劑

掃丹[®] M 粒劑

省時省工
施藥簡便
人人會用

藥效超群
兼具兩種殺草劑
之優點，可控制
全期作之雜草

安心施用
低毒
安全
無藥害

信用可靠
一流工廠製造
品質絕對保證

※ 機插
※ 手插

* 直播田 *
* 均可施用 *

※ 最安全 · 最有效之強力除草劑 ※

IHARA 台灣庵原農藥股份有限公司

總公司：台北市南京東路二段97號(敬業大樓)十樓 電話：5818156~8