

一部份梅毒螺旋菌經臍帶進入胎兒體內增殖，危及胎兒造成死胎。即使胎兒僥倖不死，安全出生，體內含有梅毒病菌，此為先天性梅毒，對胎兒的傷害大致有眼、耳、腦部異常，水腦症、肝脾腫大、低能等現象。

除病菌感染外，有的寄生蟲也會造成病菌感染，有一種動物體上的寄生蟲，如果孕婦常愛撫抱小貓、小狗等小動物，這些小動物身上附有寄生蟲，菌體容易侵入母體，造成無腦兒、小頭症等畸形兒。

一般因病菌感染所造成的畸形狀況，大致有眼：白內障、青光眼、小眼症；耳——耳聾、重聽；心

——心臟畸形；腦——小頭症、水腦症、無腦症、智能不足；其他——早產兒、骨骼發育障礙、肝脾腫大、神經錯亂等。

(二)藥物：

使用不當藥物如抗生等、安眠藥（沙利多邁）。

沙利多邁——一種鎮靜劑，由西德奇魯門特藥廠研製而成，當時發現此藥對治療孕婦初期的害喜非常有效，於是在1959年風行全球。日後經漢堡大學李茲博士研究調查發現，孕婦於懷孕35~50天之間，如服用此藥易產下四肢短缺、無耳朵、小眼、腸閉塞等畸形兒，因而

宣導禁用；孕婦在懷孕期間千萬不可服用。

孕婦在懷孕期，如服用抗生素如感冒藥、各種成藥、注射預防針、抗癌藥及荷爾蒙劑的亂用，常易造成白血球突變，能發生流產並導致畸形兒；所以孕婦感患感冒、發燒或任何疾病時，必需請教醫師，切勿隨便服用成藥。

(三)營養不良

孕婦在懷孕期間，如缺乏維他命A、B₂、葉酸及礦物質、鈣、碘等營養，容易造成胎兒裂顎、短肢、小眼、疝氣、流產等現象。

(四)放射線：

如照射X光、鉛。

懷孕4~7星期為最敏感時期，如照射放射線，易形成胎兒小頭症、無腦症等畸形。

(五)缺氧：

孕婦感患易引起缺氧的疾病，如高血壓、尿毒症、貧血、出血等，易導致胎兒腦部發育不良，形成智能不足。

(六)內分泌：

如糖尿病、胰島素分泌失調、荷爾蒙分泌失調都會導致形成巨大兒、軟骨病及半陰陽等畸形。



健康聰明（阿草）


蘆薈

- 蘆薈種苗成株批發
- 保證巨型品種
- 藥效強利潤高
- 全年均可收成

(048) 336756 (蕭天民)

PH METER 酸鹼度計

PH-440



NT\$600
超值郵購特價NT\$480

不需任何化學藥品，或染色材料，只要將土壤或葉面就可測出PH值。

LIGHT & MOISTURE METER

ML-310

光度與濕度兩用測試計

- 維護花木或蘭花永遠繁榮茁壯繁茂有適宜的光強度
- 測量適宜的濕度保持花卉繁殖最基本的工具

計量準確度500瓦
附接郵購
特價480元



Green

友玉企業股份有限公司
新營郵政信箱120
☎(066)322511~323583~326583
郵政劃撥322886友玉公司戶帳戶

Proper Light & Moisture