



白銹病

黑斑病：施用大生22水和劑 500倍液，大生45—M水和劑500倍液，大生精1,000倍液，80%四氣丹可濕性粉劑500倍都很有效。

發病期每隔7—10天施藥1次。噴藥時，葉片的正反兩面都須完全噴洒，冬季低溫時可酌量減少施藥次數。

白銹病：一發現病徵出現，可使用嘉保信 5,000倍液，錳乃浦600倍液或蓋普丹600倍液散布。使用嘉保信時，由於有些菊花品種有藥害情形出現，一定要確定沒有藥害時才能使用。

藥劑施用一般每間隔10天施用1次，最好不要同一種藥劑連續施用，可施用錳乃浦液和蓋普丹液交互使用。

蚜虫：施用24%納乃得 1,000倍液25.3%美文松乳劑1,000倍液，25%滅多松乳劑1,000倍液，50%達馬松2,000倍液或70%福文松乳劑2,000倍液，於心芽發現有虫體時開始施藥。開花初期施藥1次，以後每隔5—7天施藥1次。

紅蜘蛛：施用20%三亞蟻乳劑 800倍液，50%加力可乳劑2,000倍液，55%殺蟎多乳劑2,000倍液於移植1個月後，每4周施藥1次，同一種藥劑不宜連續施用，以免產生抗藥性。

薊馬：施用25.3%美文松乳劑 1,000倍液或70%福文松乳劑 2,000倍液，於開花期每隔3—5天施藥1次，向上向下均勻噴射。



彩色 實用食譜大贈送

訂送：描綫雜誌一年(12期) 650元

贈送：中視叢書「實用食譜」

或「鳳情千千萬」錄音帶

或「鄭少秋專輯」錄音帶

或「我是中國人」錄音帶

郵政劃撥一五四五〇帳號：中視出版部
電話：七四一—〇七五九·七一—〇三二二