

則死亡和淘汰頭數更多，損失不輕。

一般說來本病的經過相當快速，全身被滲出物膠着後3~5日就死亡。急性型表皮炎，皮膚變厚形成皺紋或龜裂，減食、脫水、衰弱，4~8日後死亡。亞急性型的病勢進展較緩慢，因此死亡率不高，但亦不容易恢復，多變成僵豬遭到淘汰。



本病發生多以胎為單位

診斷防治

滲出性表皮炎是一種發生狀況和皮膚病變很特殊的疾病。只看病狀及病勢的演變就能診斷。堆積在體毛和表皮的類似痂皮物，容易以手剝開，露出桃紅色的表皮組織。本病多發生於1個月齡內的哺乳豬為特徵，離乳小豬發生不多，中豬以上皆不發生。所以與其他皮膚病的鑑別診斷應無困難。

發病初期應迅速隔離治療，使用對葡萄球菌具有強力抗菌性的抗生素效果較好，如盤尼西林、安比西林、四環素、健大黴素等抗生素較有效。同時清潔和消毒皮膚，塗擦抗生素、碘胺藥膏，或氧化鋅硼酸軟膏等，可促進療效。

本病的發生以胎為1個單位，1胎中只要發生1頭，即迅速傳染其他仔豬，所以隔離治療很重要，以免繼續發生。發病豬舍需要徹底洗滌消毒，毛豬亦需全身消毒。



豬舍要保持清潔

雜糧會撥款3千萬 補助購置農機

台灣區雜糧發展基金會為配合政府政策，實施稻田轉作玉米、高粱，特於本年度事業經費中撥出3千萬元，補助農民購置雜糧綜合播種機164台，高粱聯合收穫機60台，脫粒機300台，及輔導設立雜糧農機代耕中心21處，同時輔導農機代耕者實施玉米高粱機械化種植，包括作畦、播種及施肥25,250公頃。

在此計畫補助下，農民及代耕者只要自備款30%，就可購買雜糧綜合播種機1台，自備70%，可以購置高粱聯合收穫機1台，購置玉米高粱脫粒機者，亦可獲30%的補助。

設立雜糧農機代耕中心一處，則可獲25萬元補助款；而且，購買上述機械的農民，均將由本計畫施以機械操作修護技術訓練，並輔導配合稻田玉米高粱代耕工作。



國產豆類播種機，可兼作畦溝。（廖敏卿）

轉作玉米高粱 雜糧會支應生產種子

稻田轉作雜糧所需的高產雜交玉米、高粱種子，均由農林廳種苗改良場生產供應，因為本年轉作面積高達5千公頃，該場目前的生產調製設備無法配合，雜糧基金會決定撥款7百多萬元，補助種苗場興建烘乾設備、購買脫粒調製機械、改建倉庫及拌藥包裝等設備，期能在本年6月間完成，以應本年春作生產的玉米、高粱種子收穫、乾燥、脫粒調製等之用。

此外，基金會並無息支應2千5百萬元，供為種苗場繁殖大量玉米種子所需的生產周轉資金。因此，本年期稻田轉作所需的玉米高粱種子，當可順利供應。