



百合花

方向，因而改變植株的生長。

(8)曲枝：將強勢直立的徒長枝先端，加以適宜的彎曲，使其脫離直立方向，稱為曲枝。曲枝可抑制強

勢枝條的徒長，矯正弱枝的適度發育，控制養分的流通，有促進花芽形成的效果。

施 肥

一般觀賞植物都應該施肥，尤以開花的草本花類及木本花類，損耗養分特多，需肥量也多。

1. 觀賞植物需要施肥的象徵：

- (1) 葉形較尋常小的。
- (2) 葉色趨於黃或淡綠色。
- (3) 芽較尋常為小，所生嫩葉先端，常呈枯萎狀。
- (4) 葉質薄而稀疏。
- (5) 草花類顯徒長狀，花芽形成不良。
- (6) 樹木類枯枝多，側枝短小。

2. 施肥的時期及種類：

- (1) 1、2年生草花類的施肥，因是以生產花朵為主，對磷肥的需要量特多，以致效性化學肥料為佳，其氮、磷、鉀的比例按5—10—4（初期需較多氮肥促進生長），4—12—4，5—10—5，6—8—6等不同比例混合。每間隔1個月施用1次，連續施用

中日合資



三笠農藥

風評越來越好！適合時代要求
省工最新稻熱病·白葉枯病特效藥



三笠 **好米得** 粒劑

- 葉、穗稻熱病，白葉枯病各施用一次，可得極佳藥效。
- 施藥簡便，吸收迅速，藥效持久(45天以上)。
- 施用一次好米得，勝過一般藥劑使用2~3次的效果。

6%每一箱內附贈汗衫一件。

台灣三笠化學工業股份有限公司

彰化市大竹里安溪西路39號
電話：(047) 38-2167(代表)