

高屏葡萄·大有可爲

成功農家



釀酒用葡萄——金香種

高屏葡萄欠收 肇因缺乏指導

高屏地區種植葡萄的歷史，已經很久，但僅止於棚架式栽培。較有系統的研究，大約在10年前，鳳山熱帶園藝試驗分所首開其端，次為台灣鳳梨公司老埤農場。此間農家也有小規模種植，然而有成功也有失敗，而失敗的原因，則因缺乏專家指導所致。

在高雄大寮鄉流行一則笑語：「種了3年葡萄無收成，差點賠了好媳婦！」這是描寫一個農家，從員林鎮請來1位美麗的小姐來幫忙種葡萄。種了3年，一直就沒有開過花，反而兒子迷上了那位小姐，結果

■ 林朝 ■

媳婦吃醋自殺獲救，這則故事到現在還流傳着。


70~72年之間 種植面積倍增

民國70年，高屏地區種植巨峯葡萄的面積，未超過5公頃，至72年已增至10公頃，今年又增至20公頃，而以茄苳青山站附近的10公頃為最多，但真正豐收者則不足10公頃。榮民昇東農場種植的釀酒用金香葡萄，收成甚好，今年計畫再種10公頃，據說已和公賣局完成契作。

高屏地區栽培的葡萄，因日照較長，施肥得宜，甜度很高，深受消費者歡迎。筆者經過數年的資料搜集和參觀，去年4月初，在鳳山市省立鳳山高中東鄰的綠地上種植生食巨峰，去年10月底就採收（後期斷水乾旱旬日），雖然產量不多，但甜度已達到標準的18度，將來甚至可以更高。

釀酒用金香種 適合高屏栽培

據專家估計，高屏地區生食用巨峰葡萄栽培面積之極限為500公頃，超過了就會價賤傷農。釀酒用金香種葡萄，只要公賣局無限制收購，每年就可照幾何級數來增加。



籬笆式栽培

金香葡萄採粗放經營，管理容易，且無病蟲害，只要專家指導，成功率甚高。

高屏地區栽培葡萄的方式有 2：一為鳳山園藝試驗分所的籬笆式（直立式），每人可管理 1 公頃左右，如採機械作業則可更多，適合大規模農場經營，每公頃約需 40 萬元的投資，約 1 至 1 年半就可回收。

另一系統為棚架式，這是傳統的經營方式，適合小規模的種植，生產品質較高，每人約可管理 $\frac{1}{2}$ 公頃，但須具有較高的技術與經驗。每公頃約需 30 萬元的投資，2~3 年後才能回收。今年春，我已擴植 $\frac{1}{2}$ 公頃，希望來年有個豐收的季節，更希望高屏地區的葡萄的生產量和品質，能比美中部的葡萄。

農家經驗

安全有效方法 防治草莓虫害—紅蜘蛛

我的成功故事

台灣各地任何農家採用新品種、新技術，或新經營方法，得到好收成、好收益，或改進生活的真實故事，1500字左右，附工作照片，註明真實姓名詳細住址。

歡迎各地農友投稿，農業推廣人員多訪問農家。訪問稿發表後，稿費從優，受訪問之農家，發表後贈送本刊一冊，不另付稿酬。



草莓栽培在目前是最熱門，最賺錢的觀光園藝作物。

民國 72 年底，政府公布實施稻田休耕與轉作政策，以及 72/73 年期草莓栽培，由於天公作美，雨量少，收成好，促使更多的農友對栽培草莓發生興趣。有關單位除了擔心將來草莓生產過剩外，更重要的還是病蟲害防治與農藥殘毒問題，急待解決，因為草莓大部分是採來生食的。

草莓的病害，主要是灰霉病與疫病，殺菌劑在採收前 3~7 天停止施藥就無大礙了，對人體較安全。而蟲害方面的紅蜘蛛，則最令農民頭痛，因為牠是最難防治的一種害蟲。

如本鄉有位果農，在春節期間，為了供遊客採摘，不施藥防治，過了春節，整片果園被害一半，只好提早插秧了。如果要防治，噴藥後必須經過 7 天以上才可採收，試問生產中的草莓，經過 7 天而不爛那才怪。目前除了期望省農業試驗所引進捕蠅早日研究成功外，就是如何使用無毒藥劑來驅除了。

有鑑於農藥殘留的問題，我在 72/73 年期栽培 0.6 分地的草莓，試



安全可採的草莓

驗以有機質肥料來施用，培育健康的草莓株，增加對病蟲的抵抗力。

至於預防工作，在栽培初期，曾使用 3 次殺蟲劑，清除果園紅蜘蛛，以後就改用無毒藥劑來預防。

一種從日本進口的石臘製劑「協養旺-C」，是葉面展着保護劑，能使葉片變厚而不易發生紅蜘蛛。另一種是由林務局退休的鄭先生提供，以蒜頭、辣椒、洋蔥等香辣作物汁液，再添加麵粉或鮮乳成為展着劑，使紅蜘蛛忌避。而麵粉與鮮乳噴到蟲體呼吸器官上，風乾後

會產生薄膜，因窒息而死。

上述 2 種無毒藥劑，不但能完全殺滅害蟲，有益的微生物也不會被殺死，可保存多數天敵而減少病害發生。今年期我種植的草莓腐爛少，很多朋友知道我以無毒劑試驗驅除紅蜘蛛，來訂購草莓的情形，相當踴躍，甚至供不應求。

去年我在第 3 次施用「芬佈賜殺蟲劑」後，每周即輪流噴洒上述無毒藥劑，草莓生長良好。今後計畫繼續擴大試驗，讓消費者能吃到安全和清潔的草莓。