

水溫不可太低（攝氏18度以上），使用剛抽出的地下水最好，浴池旁邊準備墊草，水浴不超過5分鐘，小鴨洗浴後羽毛整乾，始可趕入鴨舍。

防止其他人畜進入育雛室，進出必須換鞋子，夜間禁止熄燈，停電時需有照明設備。

15~25日齡 第1次注射

15~25日齡時，實施第一次家禽霍亂疫苗注射。

注意墊料或墊料清潔更換，小鴨食量日增，墊料糞便堆積亦加快，腹下羽毛易受糞便沾污。小鴨清除腹下糞便常把羽毛一齊啄落，致腹下羽毛稀少，減少腹部保溫，影響生長。

應注意防止貓狗進入小鴨羣內，並注意天氣變化，下雨天或氣溫降低時，小鴨要趕入鴨舍，鴨舍內要有足夠墊料保溫。

本期末改換中鴨飼料。



白菜鴨

25~35日齡 補強注射

25~35日齡，實施第2次家禽霍亂疫苗補強注射（與第1次注射相距10天）。

在腹部羽毛未完全換畢前，注意鴨牀或墊料的清潔更換，下雨天更應注意。發現羽毛不淨時，尤其腹部羽毛，應實施洗浴，更換墊料或鴨牀。

35~45日齡 不可密飼

鴨羣不可密飼，過份擁擠影響生長，使鴨羣不整齊大小參差。生長不良或緩慢的鴨隻須隔離飼養。

要防止鴨隻走失，鴨場周圍不宜存放廢物或垃圾動物屍體等。

45~55日齡 防止啄毛癖

注意發生啄毛癖，尤其下雨天鴨羣趕入鴨舍，或在皓月當空的晚上，正值鴨隻翅膀生長在「凸狗牙」時期，最易發生啄毛癖。

發現啄毛癖的鴨（鴨農稱挑皮鴨），捉來剪嘴再放回鴨羣，可防止啄毛癖的蔓延。如鴨羣啄毛癖發生嚴重，應整羣剪嘴。

本期末改換大鴨飼料，並可排定鴨羣出售日期。

中南部流行新城雞瘟 農林廳採取6項措施

省農林廳針對目前本省中南部發生新城雞瘟，採取下列各項防治對策，呼籲養雞業者注意配合辦理：

1.由政府及學術研究單位研商擬定的「肉雞及種雞疫苗防疫計畫」，迅由農林廳分送各縣市家畜疾病防治所，轉知並建議養雞業者參採。

2.希望養雞業者務必做好疫苗防疫計畫，除基礎免疫外，應再加強死毒疫苗的補強注射。

3.建議種雞場徹底實施「雞傳染性滑氏囊炎」疫苗防疫計畫，並呼籲養雞戶向實施此防疫計畫的可靠種雞場購買小雞。

4.指導肉雞場飼育，採統進統出方式，勵行衛生消毒工作，採用含溴海毒液消毒。

5.對各養雞戶繼續加強新城雞瘟H I 抗體檢查服

務。

6.繼續加強疫情調查與早期診斷。

農林廳指出，本次罹患新城雞瘟死亡的雞隻，大部分是供肉用的「土雞」或「仿仔雞」，發病日齡都在10日齡左右，並在20日齡以後便陸續死亡。死亡的小雞經剖檢結果，具有免疫作用的滑氏囊均遭破壞萎縮，因此新城雞瘟的發生，似與早期感染「傳染性滑氏囊炎」有關。由於此等飼養土雞或仿仔雞業者，在疫情防疫上很少與縣市家畜疾病防治所合作，一旦疫病流行，即造成重大損失。

因此，農林廳呼籲養雞業者，千萬不可存有僥倖心理，飼養雞隻應與當地家畜防疫單位密切聯繫，及時實施疫苗防疫工作，確保雞隻健康增加養雞收益。