

花卉生產



碧桃 多用途的木本花卉 楊紹溥

碧桃，花開滿枝，為重瓣花，花朵十分美麗，深受大眾所喜愛，是重要的木本花卉。花色有紅、火紅、鮮紅、粉紅、艷紫、雪白等，變化極多，在庭園佈置上所佔角色極重要，不論是盆花栽培、切花應用，都是時尚而可愛的植物。

碧桃是桃樹的觀賞用桃類，而另一類則為食用種，屬薔薇科桃亞屬的木本花卉，通常稱為杏花，且常用為年節的切花材料。但是杏花是屬於薔薇科梅亞屬的木本植物，根本上是兩種不同的植物，所以碧桃與杏花兩者不能混為一談。



栽培品種

- 1.單瓣白色種：花潔白色。
- 2.單瓣紅色種：花鮮紅色。
- 3.重瓣白色種：花潔白色。
- 4.重瓣紅色種：花鮮紅到赤紅色。
- 5.重瓣粉色種：花色粉紅。
- 6.撒金色種：花色紅白相間，也有粉紅、赤紅者，花千重型。
- 7.垂枝種：枝條柔軟呈下垂狀。
- 8.絳色種：花重型。
- 9.寒紅種：花紫紅色，單瓣型。
- 10.大紅種：花鮮紅色，大型花。
- 11.寒白種：花色雪白，單瓣型。
- 12.紫葉種：葉帶紫色，花色淡紅，單瓣型。
- 13.八重種：花白色，大型花，千重型。
- 14.五色種：花色紅而艷，花瓣上混以白色。

栽培技術

碧桃的栽植也與桃樹相同，栽植距離宜稀不宜密。對土壤的選擇不苛，但忌潮濕低窪之地，以砂（沙）質壤土為最理想的用土。

苗木培育時，則是採用畦作法，栽植距以1尺為宜，至第2次移植時，可採用平作法，植距以5尺為宜。但當成苗種植時，栽植距離以15~20尺為準。

種植成活之後，不需灌水與施肥，但在冬季時，必須施用一些過磷酸石灰、豆餅粉、或豆餅液，如再加施少量的草木灰，對開花之促進有所幫助。

碧桃的生長，夏季最為旺盛，所以它的灌水量宜多，如大量培育苗木時需多加注意。

碧桃主要是以嫁接法繁殖，播種法的繁殖則是以供養成砧木（台木）之用。嫁接時，乃是以切接技術為主的繁殖，也是碧桃繁殖應用的主要方法。同時進

行嫁接時，必需要有熟練的技術，而嫁接的時期，是以春分前後為適期。

剪定・整枝

碧桃的剪定要特別注意於疏枝，因進行疏剪工作之後，則翌春時新枝的生長，才不會相互擁擠，同時弱枝、強枝應一併剪除，其發育適中的枝條留長約1尺左右，對整株樹形的生育最為理想。

苗木的培育，整枝的技術非常重要，因碧桃的生長極為快速，樹姿必需修剪才會優良，開花才會多而美麗。所以整枝的目的，主要是調整樹姿，矯正樹勢，這是植株生育形態優美的基本方法。

碧桃的整枝方法極多，而樹形的整枝以杯狀與盆狀為最佳。

杯狀整枝：是1年生或2年生的幼苗栽植於地上，在1~2尺處剪斷，如株距稍遠時，可剪處稍高。於次年春發生新芽成為新枝，選擇其中3枝作為主枝，但強枝紮之，抑制其生長，弱枝可扶直，增加生長勢。可以在夏季進行，冬季將3本主枝各留1~2尺，擇枝的兩側芽處剪定。



第3年的春季，3本主枝兩側各生2本以上新梢，而生長到1~2尺時稍加誘引，使其能均衡生長，其餘新梢稍加摘心，至第3年冬6本主枝稍留1~2尺，擇左右兩側健芽作為剪口，主枝上所生小枝為側枝留1~2尺向上下的側枝剪去。

如此第4年或第5年時，12枝的杯狀整枝已成，其全樹形態呈中空、上廣、下狹，各枝生育均衡。

盆狀整枝：與杯狀整枝相似，差別在於修剪時的長短不同，但盆狀的樹姿較為低矮，管理方便，杯狀居中，培育較方便。

Ascophyllum nodosum

挪威原裝進口來台
現貨供應……。

挪威海藻產品，
提供您高收益的農業。



- 最新開發促進植物體
高蛋白質化作用。
- 純天然有機質，
含有氨基酸、維他命、醣類、
礦物質等60種以上。

一、神協產業KK.關心您的利益,購買海藻系列請指名“正”挪威國營產品

▲ 安樂肥[®]

アルキフェート[®]
ALGIFERT

特殊葉面散佈劑，天然有機

▲ 安樂吉[®]

アルキット[®]
ALGIT

生態營養土壤施用，天然有機

二、最新科技的結晶產品。

▲ 安樂力肥[®]

R.B.パワー[®]

植物體(樹液)PH之調整，
促進根、芽之活動。

▲ 神協來肥[®]

シキヤライ[®]

來自三仟萬年前天然產品，
促進細胞粒腺體機能。

遠東區總代理：
台灣區總經理：



神協產業株式會社
松洲化學工業社有限公司
豐原市豐勢路944號 TEL (045) 224792
272892

誠徵縣市經銷商
(詳細資料備索)