

的長成而使遮光太厲害，影响嫩莖葉綠素的產生。

在正常情形下，本省綠蘆筍生產期間，全年母莖更新2~3次已足夠。夏季氣溫高，雨水多時，更新母莖宜選擇晴天進行，以免造成蘆筍植株死亡或引起病害。冬季休閒期間，母莖全數保留，以培育地下根盤，提高下年度產量。

蘆筍植株高大，多數農民爲了防止倒伏，影响產量及便於田間管理工作，在不倒伏情況下，摘莖愈少產量愈高，而且陽光照射也好，通風佳，嫩莖綠色較好。因此如能避免摘莖最好，否則不盡量少摘除爲佳，或利用竹柱及鐵線，或尼龍線來立柱防止倒伏。

灌溉：依據綠蘆筍灌溉試驗結果，採收期間每7~10天灌溉1次，對綠蘆筍的產量及品質最好。冬季休閒期除施冬肥灌溉1次後，冬季期間可停止灌溉。

蘆筍雖很需要水分，但也忌太潮濕，長期性的潮濕易使蘆筍生育衰弱。因此栽培綠蘆筍的地區，必須有良好的灌排水系統，尤其栽植田的地下水位不可太高。

施肥：蘆筍是多年生作物，採收期又長，因此施肥量較一般作物稍多，施肥方法也稍有不同。綠蘆筍肥料以有機肥料及氮肥較爲重要，有機肥料除了可供

應一部份的養分外，最主要可改良土壤物理性，使土壤保持疏鬆，使土壤通氣良好，有利於保水及根部的呼吸，可促進根羣的發育，而氮肥在蘆筍的發育生長至產量上顯示極爲重要。至於磷肥及鉀肥，在綠蘆筍的肥料三要素數年的試驗結果顯示需要量不高。有關綠蘆筍的全年施肥量及施肥時期如下表：

其施用方法如下：

1.堆肥於2月份開始整理筍田及11月採收期結束時，在畦的二旁開溝施下，每次各施用50%。

2.氮肥：爲栽培蘆筍最主要且施用量最多的肥料。於春肥施用15%，夏肥10%，冬肥10%，其餘做爲採收期間的追肥施用，每月施用1次。

3.磷肥：於春肥及冬肥各施用40%，夏肥施用20%，採收期間不施用。

4.鉀肥：於春肥施用20%，夏肥及冬肥各施用10%，其餘於採收期間與氮肥混合平均施用，每月施用1次。

春肥及冬肥施用時，必須於二畦旁開溝施下。採收肥可用穴施或條施，不必開溝，也不必每次都在畦的二邊施用，可輪流單邊施下，施肥後配合灌溉，以利肥料的吸收。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號


立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

- 1.能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
- 2.能促進根群發育，防止根部老化。
- 3.能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
- 4.能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
- 5.能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
- 6.無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

徹底消滅土壤病菌

培育健苗必備良藥



* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司

台北市敦化南路514號之3參樓

電話：7052414・7050155