

實行種子消毒 施用SH土壤添加物

防治方法為：

(1)種子的消毒：使用「億力」1,000倍、「愛果



罹病植株葉部黃化

丹」750倍、「撲克拉」2,000倍等水溶液浸3~4小時，濾除藥液後，每公斤種子均勻拌入2~3公克的「億力」或「愛果丹」粉劑，使藥劑黏附於種子。

(2)田間整地時，每分地施用SH土壤添加物（中興大學植病系孫守恭、黃振文研究發展的配方）90~120公斤。若配合堆肥（每分地600~1,000公斤）或是搜集甘藍菜或芥菜殘餘剩葉（每分地600~1,000公斤）翻犁於土中，效果更佳。

(3)不可連作。

(4)在酸性田少施用硫酸銨，並設法以石灰、礦灰、尿素、硝酸鉀予以補救施用。

綜合應用上述諸法，才可達到經濟防治效益，否則效果不理想。

使用農藥，請注意使用
範圍、防治對象、使用方法
、採收前停止用藥日數。

台灣省政府農林廳

亞蔬中心委託本社代售英文專業書籍

（每次郵購另收掛號郵資16元）

郵政劃撥 5930 號豐年社

台北市溫州街14號

書名	價格 (台幣元)	內容
SWEET POTATO	600	收集第一屆國際甘藷討論會資料，包括甘藷營養價值、試管培育甘藷、甘藷病毒防治，提高甘藷產量及世界各國栽培與甘藷利用現況等講稿共44篇。 19×26(公分)·481頁
CHINESE CABBAGE	600	收集第一屆國際結球白菜討論會講稿45篇，包括日本/韓國/台灣栽培現況及病害防治與生理反應等。 19×26(公分)·489頁
TOMATO	400	收集第一屆國際熱帶番茄會議講稿30餘篇，包括番茄病虫害、生理、營養、栽培管理及育種等。 17.5×24.5(公分)·290頁
MUNGBEAN	400	收集第一屆國際綠豆會議講稿54篇，介紹斯里蘭卡/泰國/馬來西亞/尼泊爾/印度與澳洲種植綠豆的情形、綠豆利用、管理、病害及育種研究等。 20×25.5(公分)·262頁
1982 PROGRESS REPORT	400	介紹亞蔬中心1982年有關熱帶產品、結球白菜、甘藷、綠豆、大豆等作物的研究計畫報告。 19×26.5(公分)·338頁