

高溫多濕期請注意用藥安全

高溫多雨時，若使用農藥不小心，易引起藥害而致血本無歸。農林廳促請農友注意用藥安全，並提供下列方法，以防範發生藥害：

(1)很多農藥在高溫時撒布容易引起藥害，如「山陽銅」用於玫瑰，「銻乃浦」用於瓜類，「錳乃浦」用於芒果、瓜類、荔枝，「白粉克」用於瓜類，「四氫異苯肼」用於桃、梅，「貝芬錳」用於芒果，「百蟻克」用於番茄、葡萄、玫瑰，「益收」生長素用於番茄等易生藥害，因此撒布上述藥劑應選擇早晨或傍晚氣溫較低時使用。

(2)高溫多濕時部分農藥容易發生藥害：如「波爾多」用於蘋果，

「毋紋」用於蘋果、梨、葡萄，「益地安」用於瓜類幼苗期，「四氫丹」用於玫瑰，「蟻離丹」用於蘋果，「硫滅松」用於蘋果、柑桔易生藥害，應選擇較低溫的早上或傍晚使用，避免在下雨或露水很重時使用。

(3)使用移行性除草劑如「2,4-D」「達有龍」、「草滅淨」等應根據政府推薦或標示說明上的作物使用對象來使用，以免因作物吸收而發藥害。

農林廳表示農友在使用農藥時，如有不明瞭或其他疑問時，應向當地農會、區農業改良場、縣市政府等單位的技術人員詢問，一定會得到滿意的解答。



高溫多濕期，蘋果苗約應特別小心。

台中區二期稻作 注意防治福壽螺

台中區二期稻作已屆插秧期，此時最易發生福壽螺為害，台中區農業改良場促請大家採取下列防治措施，以免影響稻作生產。

一、隨時摘除卵塊及檢拾螺體，並行銷燬。

二、農田灌水口加裝細網，過濾螺體，以免福壽螺隨灌溉水流入田間為害。

三、養殖池放棄養殖時，務必將螺體及卵塊全部銷燬，不可任意棄置田間或其他可供繁殖處所。若尚在養殖中，於排水口須加阻隔細網，防止螺體流出，進入田間繁殖、蔓延，或飼養青魚（烏鯿），以減少密度，抑制繁殖。

四、施用藥劑。可用：

①45%三苯醋錫可濕性粉劑，每公頃 1.2公斤。



但如稻田附近有水產養殖業時，禁止施用此劑。施藥後 2 天內保持水深 3 公分。

②40%必芬松乳劑，每公頃 2.4 公升。施藥後 4 天內保持水深 3 公分。

③6%聚乙醛餌劑，每公頃 7 公斤，限二期稻作或高溫（水溫 25°C 以上）時使用。施藥後 4~6 天內保持水深 3 公分。

④80%聚乙醛可濕性粉劑，每公頃 1.2 公斤，限二期稻作或高溫（水溫 25°C 以上）時使用。施藥後 4~6 天內保持水深 3 公分。